

米,胎座线形。种子宽倒卵形,长约0.8毫米,密被小乳头状突起。花期9—10月,果期11月。

产陕西南部(宁强、镇巴、平利、岚皋、西乡、石泉、勉县、略阳、城固、洋县、佛坪、太白)、甘肃南部(文县、武都)、四川北部(广元、剑阁、城口)、湖北西部(神农架)。生于岩石上,海拔700—1850米。模式标本采自陕西。

71. 钝萼景天(植物分类学报) 图版28: 12—18

***Sedum leblancae*** Hamet in Repert. Sp. Nov. 8: 311. 1910; Praeg. in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 86. 1921; Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 462. 1930; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 75. pl. 42. f. 577—584. 1931; 傅坤俊, 植物分类学报 12: 73. 1974.

二年生草本? 无毛。地下根状茎近木质,节上生根。花茎直立,高5—16厘米,基部开始分枝,上部有时具乳头状突起。下部叶4数轮生,上部的互生,倒卵状线形,长4—18毫米,有钝距,先端钝,前缘有乳头状突起。花序伞房状,有多数花;苞片叶形。花为不等或相等的五基数;花梗长2—6毫米;萼片线状或线状长圆形,不等长,长3.1—3.8毫米,无距,先端钝有乳头状突起,有时上面前部有红棕色斑纹;花瓣黄色,长圆形,长3.6—7毫米,合生0.2—0.7毫米,先端近尖有突尖头;雄蕊5或10,如为10则成2轮,内轮的生于距花瓣基部1—1.7毫米处,长1.8—4.2毫米;鳞片宽线状匙形或近方形,长0.4—0.6毫米,先端微凹;心皮卵状长圆形,长3.2—6毫米,合生1.1—1.3毫米,有多数胚珠,花柱长1.8毫米。种子卵圆形,长0.6—0.7毫米,有小乳头状突起。花期9—11月,果期10—12月。

产四川西南部(木里、康定)、云南西北部(大雪山)。生于石灰岩岩石上,海拔1560—3500米。模式标本采自云南。

72. 安龙景天(植物分类学报)

***Sedum tsiangii*** Fröd. 中研丛刊 3: 199. 1933; id. in Acta Hort. Gothob. 10. Append.: 162. pl. 112. f. 1306—1314. 1933.

72a. 安龙景天(原变种) 图版28: 19—23

***Sedum tsiangii*** Fröd. var. ***tsiangii***

一年生草本,无毛。花茎近直立,高10—15厘米,下部或中部以上分枝。叶互生或基部兼轮生,倒披针形,长10—15毫米,有短钝距,先端近钝形,疏生乳头状突起。花序疏伞房状,有少数花;苞片近倒卵形。花为不等的五基数,有短梗;萼片披针形或线形,不等长,长3.5—4.2毫米,无距,先端近钝,有乳头状突起;花瓣黄色,长圆形,长4.5—5毫米,微合生或离生,先端有突尖头;雄蕊10,2轮,内轮的生于距花瓣基部0.5—1.2毫米处,长1.8—2.2毫米;鳞片方形,长0.5毫米,中部略收缩,先端截平;心皮直立,近卵形,长3.5—4.5毫米,合生0.8—1.2毫米,具短花柱,有多数胚珠,胎座线形。种子卵圆形,长