

短;种子卵形,细小。花期6—8月,果期8—9月。

产辽宁、吉林。生于海拔300—940米山地林下石上。朝鲜、日本、苏联也有。模式标本采自苏联远东地区。

77. 多花景天

Sedum floriferum Praeg. in Journ. Bot. 56: 149. 1918; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 122. f. 54d. 63. 64. 1921.

多年生草本。根状茎短,分枝,木质。茎斜上,上部稍被微乳头状突起,高15—30厘米,在上部茎发生很多短花枝。叶互生,匙状倒披针形,长2.5—4.5厘米,宽8—13毫米,先端钝圆,基部楔形,边缘上部有疏锯齿,在侧枝上的叶同形,但较小。聚伞花序顶生及腋生;花紧密;萼片5,不等长,线形至倒披针形,长2—4毫米,先端钝;花瓣5,黄色,披针形,长4—5毫米,宽1.5—2毫米;雄蕊10,较花瓣稍短;鳞片5,细小,近正方形,全缘;心皮5,直立,后稍弯曲,与雄蕊同长或稍短,花柱细长。花期6—7月。

产山东威海、烟台和沂水。生于海拔1000米以下低山地带。模式标本采自威海。

78. 堪察加景天 石板菜、黄菜子、费菜(改订植物名汇),金不换(北京植物志),北景天(东北植物检索表),横根费菜(内蒙古植物志)

Sedum kamtschaticum Fisch. Ind. Sem. Hort. Petropol. 7: 54. 1840; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 145. 1884; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 120. f. 54c, 62. 1921; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 69. 1939; Ohwi, Fl. Jap. (Engl. ed.) 496. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 89. 图1907. 1972; Fl. Coreana 3: 53. f. 45. 1974.——*Sedum aizoon* L. ssp. *kamtschaticum* (Fisch.) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 79. pl. 46. f. 604—608. 1931.

多年生草本。根状茎木质,粗,分枝。茎斜上,高15—40厘米,有时被微乳头状突起,常不分枝。叶互生或对生,少有为3叶轮生,倒披针形、匙形至倒卵形,长2.5—7厘米,宽0.5—3厘米,先端圆钝,下部渐狭,成狭楔形,上部边缘有疏锯齿至疏圆齿。聚伞花序顶生;萼片5,披针形,长3—4毫米,基部宽,下部卵形,上部线形,钝;花瓣5,黄色,披针形,长6—8毫米,先端渐尖,有短尖头,背面有龙骨状突起;雄蕊10,较花瓣稍短,花药橙黄色;鳞片5,细小,近正方形;心皮5,与花瓣稍同长或稍短,直立,基部2毫米合生。蓇葖上部呈芒状水平横展,腹面作浅囊状突起;种子细小,倒卵形,褐色。花期6—7月,果期8—9月。

产山西、河北、内蒙古、吉林。生于海拔600—1800米的多石山坡。苏联、朝鲜、日本也有。模式标本采自苏联堪察加的栽培种。

79. 齿叶景天 (拉汉种子植物名称)天黄七(四川南川) 图版 29: 12—16

Sedum odontophyllum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 7. Append.: 117. pl.