

(Fröd.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 116. 1965.

根须状,短。不育枝直立,细弱,或不存在。花茎常在基部着根,直立。叶有短距,扁平,几有柄,钝。花序有长总梗,为疏生蝎尾状聚伞花序,苞片叶状;花小,花各部数目常不等;萼筒宽,萼片小,不具距,钝;花瓣淡黄色,1毫米处合生,有短尖头;雄蕊5—10;鳞片3—5,线形至宽匙形;心皮3—5。蓇葖有1至多数种子;种子有珠柄,密被微乳头状突起。

系的模式种:大苞景天 *Sedum ampli-bracteatum* K. T. Fu (*S. bracteatum* Diels)。分布华中地区。

6种,分布自锡金、中国至日本。我国有5种1亚种及2变种。

分 种 检 索 表

1. 叶有长柄,叶片稍宽。
 2. 心皮5;蓇葖有种子1—3。
 3. 苞片圆形,或稍长;叶菱状椭圆形,长3—6厘米,先端渐狭……………81. 大苞景天 *S. ampli-bracteatum* K. T. Fu
 3. 苞片线形;叶卵形或圆形,长15—30毫米,先端圆……………82. 兴山景天 *S. wilsonii* Fröd.
 2. 心皮4;蓇葖有种子多数……………83. 四芒景天 *S. tetractinum* Fröd.
1. 叶基部渐狭,不具明显的柄,叶片狭;鳞片及心皮各为3。
 4. 叶轮生,匙状长圆形……………84. 三芒景天 *S. triactina* Berger
 4. 叶互生,线状倒披针形……………85. 薄叶景天 *S. leptophyllum* Fröd.

81. 大苞景天 (中国高等植物图鉴) 苞叶景天(植物分类学报增刊),一朵云(秦岭植物志),山胡豆(改订植物名汇),鸡爪七、活血草(湖北植物志)

Sedum ampli-bracteatum K. T. Fu, 秦岭植物志 2 卷 2 册: 425. 1974; 湖北植物志 2: 65. 图 770. 1979.——*Sedum bracteatum* Diels in Bot. Jahrb. 29: 362. 1900. non Viv. 1824; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 100. pl. 53, 54; 1. f. 794—801. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 93. 图 1915. 1972.

81a. 大苞景天 (原变种) 图版 30: 1—5

Sedum ampli-bracteatum K. T. Fu var. *ampli-bracteatum*

一年生草本。茎高15—50厘米。叶互生,上部为3叶轮生,下部叶常脱落,叶菱状椭圆形,长3—6厘米,宽1—2厘米,两端渐狭,钝,常聚生在花序下,有叶柄,长达1厘米。苞片圆形或稍长,与花略同长。聚伞花序常三歧分枝,每枝有1—4花,无梗;萼片5,宽三角形,长0.5—0.7毫米,有钝头;花瓣5,黄色,长圆形,长5—6毫米,宽1—1.5毫米,近急尖,中脉不显;雄蕊10或5,较花瓣稍短;鳞片5,近长方形至长圆状匙形,长0.7—0.8毫米;心皮5,略叉开,基部2毫米合生,长5毫米,花柱长。蓇葖有种子1—2;种子大,纺锤形,长2—3毫米,有微乳头状突起。花期6—9月,果期8—11月。