

本采自广东北部与湖南交界处。

84. 三芒景天

Sedum triactina Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 460. 1930; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 99. pl. 64; 2—3. f. 785—793. 1931.——*Triactina verticillata* Hk. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 103. 1858.——*Sedum verticillatum* (Hk. f. et Thoms.) Hamet in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 149. 1912; Hamet in Rev. Gen. Bot. 25: 92. 1916. non L.

84a. 三芒景天 (原亚种) 图版 30: 12—18

Sedum triactina Berger ssp. ***triactina***

细弱草本。花茎长7—35厘米。叶常3叶轮生或对生，中部叶常宿存，叶匙状长圆形，长7—35毫米，宽达7毫米，先端钝圆或有缺，基部狭楔形。聚伞花序，花疏生；苞片倒卵圆形至近圆形，长5—10毫米，宽达6毫米；萼片5，狭三角状长圆形，长1毫米，宽0.3—0.4毫米，先端钝；花瓣5，黄色，狭长圆形，长4—6.5毫米，宽2—3毫米，先端钝；雄蕊10，较花瓣稍短，对瓣的着生基部上0.5—0.8毫米处；鳞片3，线形，长0.6—0.7毫米；心皮3，略叉开，腹面稍呈浅囊状，基部1.5—2.5毫米合生，全长5毫米，花柱长1毫米在内。蓇葖略叉开；种子每心皮中1—2，长圆状卵形，长0.6毫米，有微乳头状突起。花期6—7月，果期8月。

产西藏、云南、四川。生于海拔2250—3600米的山坡林下水边湿地。锡金也有。模式标本采自锡金。

84b. 小三芒景天 (亚种)

Sedum triactina Berger ssp. ***leptum*** Fröd. in Acta Hort. Gothob. 15: 28. pl. 6; 2. f. 185—195. 1942.

植株较细弱，基部发出多数茎，高9—14厘米。叶小，长不及1厘米，近先端有微乳头状突起。鳞片线状匙形，长1毫米，先端有微缺；心皮3，或在顶端花中为4，基部1—2毫米合生。蓇葖有种子2—3。

产四川康定。生于海拔3700米的高山杜鹃花丛下多藓石上。未见标本，根据原记载描述。

85. 薄叶景天 (拉汉种子植物名称) 图版 30: 19—24

Sedum leptophyllum Fröd. in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 412. Abb. 12, 1—8. 1931; id. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 101. pl. 65; 3. f. 802—809. 1931.

植株无毛，高10—20厘米。须根短。不育枝细弱，高8.5厘米，顶端有6—7叶簇生。花茎自基部发出，下部不具叶。3叶轮生，叶狭线状披针形至狭线状倒披针形，长2—3.5厘米，宽1—2毫米，先端钝，基部有短距。花序伞房蝎尾状，宽达8厘米；花几无梗；苞片