

86. 白果景天 (拉汉种子植物名称) 图版 31: 1—6

Sedum leucocarpum Franch. in Journ. de Bot. 10: 288. 1896; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 91. pl. 58. f. 721—730. 1931.——*Sedum varicolor* Praeg. in Journ. Bot. 57: 57. 1917; id. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 234. f. 136, 137. 1921.

多年生草本, 植株无毛。须根多。茎高5—20厘米, 有不育枝。叶互生, 稀近3叶轮生的, 稍密生, 匙形或宽倒卵形, 长1.2—2厘米, 宽4—7毫米, 先端钝或有细尖, 基部楔形, 有短距, 全缘, 无柄。伞房状花序, 宽5—7.5厘米, 分枝3条, 每分枝常再2分枝, 有微乳头状突起; 花无梗; 萼片4—5, 不等长, 长圆状线形、长圆状披针形或长圆状匙形, 长3—10毫米, 先端钝, 基部稍宽, 不具距; 花瓣4—5, 深黄色, 卵状长圆形或披针状长圆形, 长5—7毫米, 宽1.3—1.5毫米, 渐尖, 有短尖; 雄蕊8—10, 长4毫米, 对瓣的着生近基部; 鳞片4—5, 近正方形, 长0.6—0.8毫米, 宽0.5—0.6毫米, 先端有微缺; 心皮4—5, 全长4毫米, 花柱长1.5—1.8毫米在内, 初直立, 后开展, 腹面浅囊状。蓇葖星芒状开展; 种子长圆形, 长0.3毫米, 被微乳头状突起, 棕色。花期8—10月, 果期10月。

产云南西北部及四川西南部。生于海拔1800—2800米的石旁。模式标本采自云南大理大坪子。

87. 汶川景天 (植物分类学报增刊)

Sedum wenchuanense S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 116. 1965.

多年生草本, 无毛。根状茎短, 下部着生须根, 上部发出多数枝条。茎高7厘米, 直立, 下部无叶, 上部着生叶; 有不育枝及花茎。叶互生, 覆瓦状排列, 卵形, 长3—4毫米, 宽1.5—2毫米, 先端急尖, 钝, 基部圆形, 无柄, 有距, 全缘, 厚肉质。聚伞状花序, 宽1.5厘米; 苞片线形; 花无梗; 萼片5, 卵形至披针形, 长2.5—3毫米, 宽1—1.2毫米, 急尖, 钝, 有距; 花瓣5, 披针形, 长3—3.5毫米, 宽1毫米, 先端有短尖; 雄蕊10, 较花瓣短, 花丝长2毫米, 对瓣的着生基部上1毫米处, 花药黄色; 鳞片四方形, 长0.4毫米, 宽0.6毫米, 先端钝; 心皮5, 卵状披针形, 与雄蕊稍等长, 略叉开, 花柱长0.8毫米, 细。蓇葖直径4毫米, 水平星芒状排列, 基部0.5毫米合生, 腹面浅囊状隆起; 种子10—12粒。花期6月。

产四川汶川, 海拔1350米。

88. 长萼景天

Sedum woronowii Hamet in Repert. Sp. Nov. 8: 315. 1910; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 90. 1931.

一年生草本。根须状。花茎直立, 长12厘米, 稍细弱, 不分枝, 无毛。叶互生, 未见。伞房状花序, 疏松, 花序长6厘米, 宽9厘米; 苞片未见; 花梗长0.8—1.1毫米; 花多数; 萼片5, 不等长, 线状倒卵形, 长4—8.8毫米, 宽2—2.3毫米, 先端钝, 基部合生, 不具距; 花瓣5, 较萼短, 线状三角形, 长4—4.4毫米, 宽1.4—1.6毫米, 先端急尖, 全缘; 雄蕊10,