

对萼的长 3—3.3 毫米,对瓣的在花瓣中部以下着生,贴生部分长 1 毫米,分离部分长 2—2.3 毫米,花药长 0.4 毫米;鳞片 5,线形,长 0.8—1.1 毫米,宽 0.2 毫米,先端钝;心皮 5,略叉开的,1.2—1.5 毫米合生,分离部分长 2.8—3.2 毫米,花柱长 0.8—1 毫米。蓇葖种子多数,叉开的,腹面浅囊状;种子倒卵形,长 0.6 毫米,有微乳头状突起。果期 11 月。

产云南大理大坪子。未见标本,根据原始记载描述。

89. **多茎景天** (拉汉种子植物名称) 九头狮子草、岩如意(云南) 图版 31: 7—12

Sedum multicaule Wall. Cat. n. 7232. 1828—49, nom., Lindl. Bot. Reg. II. 3: Misc. 58. 1840; Hamet in Bull. Soc. Bot. France 56: 47. 1909. c. descr.; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 259. f. 152. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 83. pl. 51: 1. f. 627—635. 1931; 秦岭植物志 1 卷 2 册: 423. 1974.——*Sedum mekongense* Praeg. in Not. Bot. Gard. Edinb. 13: 89; pl. 177, 1: a—d. 1921.


多年生草本。茎下部分枝,高 5—15 厘米,无毛。叶互生,覆瓦状排列,线形至狭长圆形,长 10—15 毫米,宽 1—2 毫米,先端渐尖,有细尖头,基部有短距。聚伞花序有数个蝎尾状分枝,分枝中央有 1 花;花无梗;萼片 5,线形至线状披针形,不等长,长 5—6.5 毫米,先端渐尖,有细尖头,基部无距;花瓣 5,黄色,长圆状卵形,长 5—6 毫米,先端有长的尖头;雄蕊 10,稍短于花瓣;鳞片 5,细小,匙状四方形,长宽各 0.5 毫米,先端有微缺;心皮 5,幼时近直立,果时横展。蓇葖长 4—6 毫米;种子卵圆形,长 0.5—0.7 毫米。花期 7—8 月,果期 8—9 月。

产西藏(海拔 1700—3500 米)、云南(1600—2900 米)、四川西部(1500—2100 米)、陕西及甘肃(1300 米)。生于山坡林下石上。巴基斯坦、印度、锡金、不丹、缅甸也有分布。模式标本采自喜马拉雅山区。

90. **短茎景天** (拉汉种子植物名称) 伏连草(湖北保康) 图版 32: 1—9

Sedum yvesii Hamet in Repert. Sp. Nov. 8: 27. 1910; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 84. pl. 50: 3. f. 646—653. 1931; 湖北植物志 2: 66. 图 771. 1979.

草本。不育枝长 4—8 厘米,根须状。花茎直立,长 7—13 厘米,基部分枝,无毛。4 叶轮生,宽线形至倒披针状线形,长 5—10 毫米,宽 1—2 毫米,先端钝,基部有距,无柄,全缘。伞房状花序,长 8—15 毫米,宽 1.5—2.5 厘米,花少数;苞片与叶相似;花梗长 1—1.5 毫米;萼片 5,宽线形至倒披针形,不等长,长 3—6 毫米,宽 1—1.4 毫米,先端钝;花瓣 5,黄色,长圆状卵形,长 5 毫米,宽 2 毫米;雄蕊 10,对萼的长 3 毫米,对瓣的着生基部稍上处,长 2 毫米;鳞片 10,长方状楔形,长 0.4 毫米,先端稍平或稍有缺;心皮 5,长圆形,长 3 毫米,基部 0.5—1 毫米合生,花柱长 1 毫米。蓇葖稍叉开,腹面浅囊状隆起,种子



1—6. 白果景天 *Sedum leucocarpum* Franch.: 1. 全株; 2. 叶; 3. 萼片;
4. 花瓣及雄蕊; 5. 鳞片; 6. 心皮。7—12. 多茎景天 *Sedum multicaule* Wall.
ex Lindl.: 7. 全株; 8. 叶; 9. 萼片; 10. 花瓣及雄蕊; 11. 鳞片; 12. 心皮。
13—18. 爪瓣景天 *Sedum onychopetalum* Fröd.: 13. 全株; 14. 叶; 15. 萼片;
16. 花瓣及雄蕊; 17. 鳞片; 18. 心皮。19—24. 藓状景天 *Sedum polytrichoides*
Hemsl.: 19. 全株; 20. 叶; 21. 萼片; 22. 花瓣及雄蕊; 23. 鳞片; 24. 心皮。

(蔡淑琴绘)