

Gothob. 10: Append.: 163. f. 1315—1323. 1935; 江苏南部种子植物手册 329. 图 526. 1959.

多年生草本。根须状。植株无毛，带紫色。不育枝细，近直立，高 2—4 厘米，密生叶，叶对生或轮生。花茎数个丛生，近直立，高 5—12 厘米。3—4 叶轮生，宽线形或披针形，长 6—11 毫米，宽 1—1.5 毫米，先端钝，基部有短距。聚伞花序蝎尾状，顶生，多花；苞片近长圆形，钝，长 5 毫米；花无梗；萼片 5，宽线形至近长圆形，长 2.5 毫米，宽 0.8 毫米，先端钝，基部无距；花瓣 5，黄色，披针形，长 5 毫米，宽 1.2 毫米，先端有短尖；雄蕊 10，对瓣的长 3 毫米，在基部上 0.5—1.8 毫米着生，对萼的长 4 毫米；鳞片 5，近四方形，长 0.5 毫米，宽 0.4 毫米，先端有微缺；心皮 5，基部 1 毫米合生，略叉开，腹面浅囊状，全长 5 毫米，花柱长 1 毫米在内。蓇葖种子多数；种子近卵形，长 0.5 毫米，被微乳头状突起。花期 4—5 月，果期 5—6 月。

产江苏南京、苏州及安徽黄山。生于阴湿石上。模式标本采自南京紫金山。

94. 佛甲草 (图经本草) 佛指甲、铁指甲 (广州植物志), 狗牙菜 (秦岭植物志), 金菊插 (台湾植物志) 图版 32: 17—24

Sedum lineare Thunb. Fl. Jap. 184. 1787; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 149. 1883; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 227. f. 131. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 87. pl. 53, 54. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 90. 图 1910. 1972; 秦岭植物志 1 卷 2 册 424. 1974; Liu, T. S. et N. J. Chung in Fl. Taiwan 3: 19. 1977; 湖北植物志 2: 67. 图 773. 1979.——*Sedum obtuso-lineare* Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 111. 1913.

多年生草本，无毛。茎高 10—20 厘米。3 叶轮生，少有 4 叶轮或对生的，叶线形，长 20—25 毫米，宽约 2 毫米，先端钝尖，基部无柄，有短距。花序聚伞状，顶生，疏生花，宽 4—8 厘米，中央有一朵有短梗的花，另有 2—3 分枝，分枝常再 2 分枝，着生花无梗；萼片 5，线状披针形，长 1.5—7 毫米，不等长，不具距，有时有短距，先端钝；花瓣 5，黄色，披针形，长 4—6 毫米，先端急尖，基部稍狭；雄蕊 10，较花瓣短；鳞片 5，宽楔形至近四方形，长 0.5 毫米，宽 0.5—0.6 毫米。蓇葖略叉开，长 4—5 毫米，花柱短；种子小。花期 4—5 月，果期 6—7 月。


产云南、四川、贵州、广东、湖南、湖北、甘肃、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、福建、台湾、江西。生于低山或平地草坡上。日本也有。模式标本采自日本。

全草药用，有清热解毒、散瘀消肿、止血之效。

95. 禾叶景天

Sedum grammophyllum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 10: Append.: 164. f. 1324—1331. 1936. cum descr. angl.

不育枝小。花茎弱，斜上，下部生根，高 14—20 厘米。中下部的叶有长距，轮生，线形



1—9. 短蕊景天 *Sedum yvesii* Hamet: 1.花枝; 2.叶; 3—5.萼片; 6.花瓣及雄蕊; 7、8.鳞片; 9.心皮(未成熟)。10—16. 四叶景天 *Sedum quaternatum* Praeg.: 10花枝; 11.叶; 12.萼片; 13.花瓣及雄蕊; 14、15.鳞片; 16.心皮(未成熟)。17—24. 佛甲草 *Sedum lineare* Thunb.: 17.花枝; 18—20.萼片(未成熟); 21.花瓣及雄蕊; 22、23.鳞片; 24.蓇葖(未成熟)。25—32. 东南景天 *Sedum alfredii* Hance: 25.植株; 26—28.萼片; 29.花瓣及雄蕊; 30、31.鳞片; 32.心皮。(钱存源绘)