

Gothob. 10: Append.: 163. f. 1315—1323. 1935; 江苏南部种子植物手册 329. 图 526. 1959.

多年生草本。根须状。植株无毛，带紫色。不育枝细，近直立，高 2—4 厘米，密生叶，叶对生或轮生。花茎数个丛生，近直立，高 5—12 厘米。3—4 叶轮生，宽线形或披针形，长 6—11 毫米，宽 1—1.5 毫米，先端钝，基部有短距。聚伞花序蝎尾状，顶生，多花；苞片近长圆形，钝，长 5 毫米；花无梗；萼片 5，宽线形至近长圆形，长 2.5 毫米，宽 0.8 毫米，先端钝，基部无距；花瓣 5，黄色，披针形，长 5 毫米，宽 1.2 毫米，先端有短尖；雄蕊 10，对瓣的长 3 毫米，在基部上 0.5—1.8 毫米着生，对萼的长 4 毫米；鳞片 5，近四方形，长 0.5 毫米，宽 0.4 毫米，先端有微缺；心皮 5，基部 1 毫米合生，略叉开，腹面浅囊状，全长 5 毫米，花柱长 1 毫米在内。蓇葖种子多数；种子近卵形，长 0.5 毫米，被微乳头状突起。花期 4—5 月，果期 5—6 月。

产江苏南京、苏州及安徽黄山。生于阴湿石上。模式标本采自南京紫金山。

94. 佛甲草 (图经本草) 佛指甲、铁指甲 (广州植物志), 狗牙菜 (秦岭植物志), 金菊插 (台湾植物志) 图版 32: 17—24

Sedum lineare Thunb. Fl. Jap. 184. 1787; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 149. 1883; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 227. f. 131. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 87. pl. 53, 54. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 90. 图 1910. 1972; 秦岭植物志 1 卷 2 册 424. 1974; Liu, T. S. et N. J. Chung in Fl. Taiwan 3: 19. 1977; 湖北植物志 2: 67. 图 773. 1979.——*Sedum obtuso-lineare* Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 111. 1913.

多年生草本，无毛。茎高 10—20 厘米。3 叶轮生，少有 4 叶轮或对生的，叶线形，长 20—25 毫米，宽约 2 毫米，先端钝尖，基部无柄，有短距。花序聚伞状，顶生，疏生花，宽 4—8 厘米，中央有一朵有短梗的花，另有 2—3 分枝，分枝常再 2 分枝，着生花无梗；萼片 5，线状披针形，长 1.5—7 毫米，不等长，不具距，有时有短距，先端钝；花瓣 5，黄色，披针形，长 4—6 毫米，先端急尖，基部稍狭；雄蕊 10，较花瓣短；鳞片 5，宽楔形至近四方形，长 0.5 毫米，宽 0.5—0.6 毫米。蓇葖略叉开，长 4—5 毫米，花柱短；种子小。花期 4—5 月，果期 6—7 月。

产云南、四川、贵州、广东、湖南、湖北、甘肃、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、福建、台湾、江西。生于低山或平地草坡上。日本也有。模式标本采自日本。

全草药用，有清热解毒、散瘀消肿、止血之效。

95. 禾叶景天

Sedum grammophyllum Fröd. in Acta Hort. Gothob. 10: Append.: 164. f. 1324—1331. 1936. cum descr. angl.

不育枝小。花茎弱，斜上，下部生根，高 14—20 厘米。中下部的叶有长距，轮生，线形

或倒披针形,长2—3厘米,宽3—4毫米,先端钝,有微乳头状突起。花序疏蝎尾状,花少数;苞片长10—15毫米;萼片5,宽披针形,长4—5毫米,不等长,宽1毫米,先端近急尖;花瓣5,黄色,披针形,长6毫米,宽1.2毫米,渐尖,有长的短尖;雄蕊10,长4—5毫米,对瓣的在基部以上1.5—2毫米处着生;鳞片5,近匙状四方形,长宽各0.5毫米,稍凹;心皮5,近星芒状排列,花柱长1毫米,全长4.5—5.5毫米。种子小,卵形,长0.4毫米。花期5月。

产广东英德(模式产地)至广西容县。

96. **垂盆草** 豆瓣菜、狗牙瓣、石头菜、佛甲草(秦岭植物志),爬景天(北京植物志),卧茎景天(东北植物检索表),火连草、豆瓣子菜、金钱挂、水马齿苋、野马齿苋(改订植物名汇),匍行景天(经济植物手册),狗牙草(湖北植物志)

Sedum sarmentosum Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Étrang. 2: 104. 1833; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 189. 1883; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 85. pl. 52. f. 654—674. 1931; 江苏南部种子植物手册 329. 图 525. 1959; 刘慎谔等, 东北植物检索表 124. 图版 33. 图 3. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 90. 图 1909. 1972; 秦岭植物志 1 卷 2 册: 423. 1974; Fl. Coreana 3: 58. f. 51. 1974; 湖北植物志 2: 66. 图 772. 1979.——*Sedum shearereri* S. Moore in Journ. Bot. 13: 227. 1875; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 153. 1883.——*Sedum sarmentosum* Bunge f. *major* Diels Bot. Jahrb. 29: 362. 1900.——*Sedum kouyangense* Lévl. et Vant. in Lévl. Fl. Kouy-Tchéou, 118. 1914, nom. nud.

多年生草本。不育枝及花茎细,匍匐而节上生根,直到花序之下,长10—25厘米。3叶轮生,叶倒披针形至长圆形,长15—28毫米,宽3—7毫米,先端近急尖,基部急狭,有距。聚伞花序,有3—5分枝,花少,宽5—6厘米;花无梗;萼片5,披针形至长圆形,长3.5—5毫米,先端钝,基部无距;花瓣5,黄色,披针形至长圆形,长5—8毫米,先端有稍长的短尖;雄蕊10,较花瓣短;鳞片10,楔状四方形,长0.5毫米,先端稍有微缺;心皮5,长圆形,长5—6毫米,略叉开,有长花柱。种子卵形,长0.5毫米。花期5—7月,果期8月。

产福建、贵州、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏、甘肃、陕西、河南、山东、山西、河北、辽宁、吉林、北京(模式产地)。生于海拔1600米以下山坡阳处或石上。朝鲜、日本也有。

全草药用,能清热解毒。

97. **柔毛景天** (拉汉种子植物名称)

Sedum gjajai Hamet in Repert. Sp. Nov. 8: 313. 1910; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 90. pl. 57; 1. f. 711—720. 1931.