

或倒披针形,长2—3厘米,宽3—4毫米,先端钝,有微乳头状突起。花序疏蝎尾状,花少数;苞片长10—15毫米;萼片5,宽披针形,长4—5毫米,不等长,宽1毫米,先端近急尖;花瓣5,黄色,披针形,长6毫米,宽1.2毫米,渐尖,有长的短尖;雄蕊10,长4—5毫米,对瓣的在基部以上1.5—2毫米处着生;鳞片5,近匙状四方形,长宽各0.5毫米,稍凹;心皮5,近星芒状排列,花柱长1毫米,全长4.5—5.5毫米。种子小,卵形,长0.4毫米。花期5月。

产广东英德(模式产地)至广西容县。

96. **垂盆草** 豆瓣菜、狗牙瓣、石头菜、佛甲草(秦岭植物志),爬景天(北京植物志),卧茎景天(东北植物检索表),火连草、豆瓣子菜、金钱挂、水马齿苋、野马齿苋(改订植物名汇),匍行景天(经济植物手册),狗牙草(湖北植物志)

*Sedum sarmentosum* Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Étrang. 2: 104. 1833; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 189. 1883; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 85. pl. 52. f. 654—674. 1931; 江苏南部种子植物手册 329. 图 525. 1959; 刘慎谔等, 东北植物检索表 124. 图版 33. 图 3. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 90. 图 1909. 1972; 秦岭植物志 1 卷 2 册: 423. 1974; Fl. Coreana 3: 58. f. 51. 1974; 湖北植物志 2: 66. 图 772. 1979.——*Sedum shearereri* S. Moore in Journ. Bot. 13: 227. 1875; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 153. 1883.——*Sedum sarmentosum* Bunge f. *major* Diels Bot. Jahrb. 29: 362. 1900.——*Sedum kouyangense* Lévl. et Vant. in Lévl. Fl. Kouy-Tchéou, 118. 1914, nom. nud.

多年生草本。不育枝及花茎细,匍匐而节上生根,直到花序之下,长10—25厘米。3叶轮生,叶倒披针形至长圆形,长15—28毫米,宽3—7毫米,先端近急尖,基部急狭,有距。聚伞花序,有3—5分枝,花少,宽5—6厘米;花无梗;萼片5,披针形至长圆形,长3.5—5毫米,先端钝,基部无距;花瓣5,黄色,披针形至长圆形,长5—8毫米,先端有稍长的短尖;雄蕊10,较花瓣短;鳞片10,楔状四方形,长0.5毫米,先端稍有微缺;心皮5,长圆形,长5—6毫米,略叉开,有长花柱。种子卵形,长0.5毫米。花期5—7月,果期8月。

产福建、贵州、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏、甘肃、陕西、河南、山东、山西、河北、辽宁、吉林、北京(模式产地)。生于海拔1600米以下山坡阳处或石上。朝鲜、日本也有。

全草药用,能清热解毒。

97. **柔毛景天** (拉汉种子植物名称)

*Sedum gjajai* Hamet in Repert. Sp. Nov. 8: 313. 1910; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 90. pl. 57; 1. f. 711—720. 1931.