

柄,倒卵状长圆形,长3.5—5.3毫米,宽1—2毫米,边有微乳头状突起;萼片5,基部合生,不等长,3片小,线形,长1.7—2毫米,2片大,长圆状线形,长2.5—3毫米;花瓣5,黄色,长圆状披针形,长3.6—4毫米,先端有短尖;雄蕊10,长2.5—3毫米;鳞片5,半长圆状正方形,长0.3—0.4毫米;心皮5,卵状披针形,长2.3—2.6毫米,基部合生,花柱长1毫米。蓇葖稍叉开,腹面稍作浅囊状;种子多数,长圆形,长0.6毫米,有微乳头状突起。花期9月,果期10月。

产云南西北部及四川西南部。模式标本采自云南宾川。

108b. 远齿粗壮景天(变种) 齿圆佛甲草(东北林学院植物研究室汇刊)

Sedum engleri Hamet var. **dentatum** S. H. Fu 东北林学院植物研究室汇刊 6:74.

1980.

与模式变种区别在本变种边缘有疏牙齿。

产湖北咸丰。

组5. 岷江景天组*——**Sect. Balfouria** (H. Ohba) S. H. Fu, 东北林学院植物研究室汇刊 6: 74. 1980.——*Sedum* L. subgen. *Balfouria* H. Ohba in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo III. 12: 177. 1978.——*Sedum* sect. *Rhodiola* ser. *Primuloides* Praeg. group *Brevicaules* Praeg. in Trans. Bot. Soc. Edinb. 27: 117. 1917, p. min. p., nonnisi *S. balfouri*, excl. cet. sp. cit.——*Sedum* L. sect. *Rhodiola* subsect. *Primuloidea* (Praeg.) Berger §. *Brevicaulia* (Praeg.) Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 443. 1930, p. min. p., nonnisi *S. balfouri*, excl. cet. sp. cit.——*Sedum* L. sect. *Asiatica Genuina Orthocarpia* Fröd. group *Umbilicoides* Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.:25. 1931, p. min. p., nonnisi *S. balfouri*, excl. cet. sp. cit.——*Rhodiola* L. sect. *Primuloides* (Praeg.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 118. 1965, p. min. p., nonnisi *R. balfouri*, excl. cet. sp. cit.

多年生草本,有明显的疏松的莲座。花茎自莲座中央生出,花序总梗分为三歧的蝎尾状;萼片基部稍合生,稍不同长;花瓣黄色,分离;雄蕊两轮,外轮对瓣的;心皮近直立,基部稍合生;胚珠每心皮中多数。

组的模式种即单一种:贡费菜 *Sedum balfouri* Hamet.

109. 岷江景天 (拉汉种子植物名称) 贡山红景天、巴氏红景天 (植物分类学报增刊)图版 33: 22—29

* 系的异名: 费菜属贡费菜组(东北林学院植物研究室汇刊)。