

in *Acta Hort. Gothob.* 6. Append.: 33. f. 232—240. 1931.

多年生草本?根状茎短,稍粗,分枝。不育枝未见;花茎直立,不分枝,高8—12厘米。基生叶未见;茎生叶互生,线状披针形至长圆形,长4—7毫米,宽1.2—5毫米,先端近急尖,基部无距。花序近伞房状,稍疏松;苞片披针形至卵圆形,长3.5毫米;宽1.5毫米;花梗长3.5—8毫米;花两性;萼片5,三角形或半长圆形,长2毫米,宽1.1毫米,先端几急尖,基部无距;花瓣5,红色,宽线状披针形,长5—5.5毫米,宽2.3毫米,先端几急尖,基部1.5毫米合生;雄蕊10,对瓣的着生基部上1.5毫米处,花丝长3毫米;鳞片5,近正方形,长宽各1毫米,先端稍有微缺;心皮5,略叉开,长圆形,长3.7—4毫米,花柱长1.1—1.2毫米在内,基部稍合生。蓇葖有种子6—10;种子平滑,长1毫米。花期9月。

产内蒙古。未见标本,根据原记载及文献描写。

112. 的确景天

Sedum definitum Lévl. in *Bull. Soc. Agr. Sci. Arts Sarthe* 39: 319. 1904, et in *Repert. Sp. Nov.* 6: 373. 1909.

茎上升的,粗壮而分枝。圆锥花序,排列宽广而疏松。花单一着生在两歧分枝的交叉中;有苞片;萼片钝;花瓣渐尖,长为萼片的二倍;雄蕊8,不伸出;心皮1—5,与花柱同长。花期7月。

产北京附近。未见标本,根据文献描述。

113. 红子佛甲草 (台湾植物志)

Sedum erythrospermum Hayata, *Ic. Pl. Formos.* 3: 110. 1913; Liu, T. S. et N. J. Chung in *Fl. Taiwan* 3: 17. 1977.——*Sedum arisanense* Yamamoto, *Suppl. Ic. Pl. Formos.* 2: 19. f. 12. 1926.——*Sedum brachyrhynchum* Yamamoto, *l. c.* 2: 19, 1926.

一年生草本?茎细弱,分枝叉开的。3叶轮生或对生,倒卵状匙形,长8毫米,宽2.5毫米,先端钝,基部渐狭,有距,全缘。聚伞花序花疏生,无梗;萼片5,线形,长2毫米,宽0.5毫米,先端钝;花瓣5,披针形,长5毫米,先端急尖,钝,有3脉;雄蕊10;心皮5,成熟时极叉开的,基部合生,长3.5毫米,宽2毫米,先端有喙,喙长1毫米。种子卵状椭圆形,长1毫米,两端有细尖,红色。

产我国台湾玉山、阿里山、次高山。模式标本采自台湾玉山。

114. 格林景天 高原景天(拉汉种子植物名称)

Sedum gorisii Hamet in *Candollea* 4: 33. 1929.

产我国西藏。未见标本。近据大场秀章,此种为柴胡红景天的异名。

115. 小萼佛甲草 (台湾植物志) 小萼景天(拉汉种子植物名称)

Sedum microsepalum Hayata, *Ic. Pl. Formos.* 3: 111. 1913; Liu, T. S. et N. J. Chung in *Li, Fl. Taiwan* 3: 19. 1977.——*Sedum parvisepalum* Yamamoto,