

in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 33. f. 232—240. 1931.

多年生草本?根状茎短,稍粗,分枝。不育枝未见;花茎直立,不分枝,高8—12厘米。基生叶未见;茎生叶互生,线状披针形至长圆形,长4—7毫米,宽1.2—5毫米,先端近急尖,基部无距。花序近伞房状,稍疏松;苞片披针形至卵圆形,长3.5毫米;宽1.5毫米;花梗长3.5—8毫米;花两性;萼片5,三角形或半长圆形,长2毫米,宽1.1毫米,先端几急尖,基部无距;花瓣5,红色,宽线状披针形,长5—5.5毫米,宽2.3毫米,先端几急尖,基部1.5毫米合生;雄蕊10,对瓣的着生基部长1.5毫米处,花丝长3毫米;鳞片5,近正方形,长宽各1毫米,先端稍有微缺;心皮5,略叉开,长圆形,长3.7—4毫米,花柱长1.1—1.2毫米在内,基部稍合生。蓇葖有种子6—10;种子平滑,长1毫米。花期9月。

产内蒙古。未见标本,根据原记载及文献描写。

112. 的确景天

Sedum definitum Lévl. in Bull. Soc. Agr. Sci. Arts Sarthe 39: 319. 1904, et in Repert. Sp. Nov. 6: 373. 1909.

茎上升的,粗壮而分枝。圆锥花序,排列宽广而疏松。花单一着生在两歧分枝的交叉中;有苞片;萼片钝;花瓣渐尖,长为萼片的二倍;雄蕊8,不伸出;心皮1—5,与花柱同长。花期7月。

产北京附近。未见标本,根据文献描述。

113. 红子佛甲草 (台湾植物志)

Sedum erythrospermum Hayata, Ic. Pl. Formos. 3: 110. 1913; Liu, T. S. et N. J. Chung in Fl. Taiwan 3: 17. 1977.——*Sedum arisanense* Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 2: 19. f. 12. 1926.——*Sedum brachyrhynchum* Yamamoto, l. c. 2: 19, 1926.

一年生草本?茎细弱,分枝叉开的。3叶轮生或对生,倒卵状匙形,长8毫米,宽2.5毫米,先端钝,基部渐狭,有距,全缘。聚伞花序花疏生,无梗;萼片5,线形,长2毫米,宽0.5毫米,先端钝;花瓣5,披针形,长5毫米,先端急尖,钝,有3脉;雄蕊10;心皮5,成熟时极叉开的,基部合生,长3.5毫米,宽2毫米,先端有喙,喙长1毫米。种子卵状椭圆形,长1毫米,两端有细尖,红色。

产我国台湾玉山、阿里山、次高山。模式标本采自台湾玉山。

114. 格林景天 高原景天 (拉汉种子植物名称)

Sedum gorisii Hamet in Candollea 4: 33. 1929.

产我国西藏。未见标本。近据大场秀章,此种为柴胡红景天的异名。

115. 小萼佛甲草 (台湾植物志) 小萼景天 (拉汉种子植物名称)

Sedum microsepalum Hayata, Ic. Pl. Formos. 3: 111. 1913; Liu, T. S. et N. J. Chung in Li, Fl. Taiwan 3: 19. 1977.——*Sedum parvisepalum* Yamamoto,

Suppl. Icon. Pl. Formos. 2; 22. f. 14. 1926.

茎基部匍匐，节上生根，上部上升的。叶互生，匙形，长22毫米，宽5毫米，先端钝，基部渐狭，无毛，有短距。聚伞花序，分枝极叉开的；苞片披针状线形，长1.5毫米，先端钝；萼片5，线形，不等长，最长1片长4毫米，其余的长2毫米，宽0.5毫米，先端钝；花瓣5，线状披针形，长6毫米，宽2毫米，先端有短尖，背面有龙骨状突起；雄蕊10，长4毫米；鳞片5，长宽各0.3—0.4毫米，先端有微缺；心皮5，基部2毫米合生，全长4.5毫米，花柱长1.5—2毫米在内。花期8—10月，果期10月。

产我国台湾中部山地，海拔1800—3000米。未见标本，根据原记载及文献描述。模式标本采自台湾玉山。

116. 能高佛甲草 (台湾植物志) 台岛景天 (拉汉种子植物名称)

Sedum nokoense Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 2; 21. 1926; Liu T.S. et N. J. Chung in Fl. Taiwan 3; 20. 1977.

草本。茎高9—19厘米，基部斜倚的，节上生根，上部分枝。叶互生，匙形，长6—10毫米，宽3—5毫米，先端钝，基部圆，全缘。聚伞花序，聚伞花数次分枝；花无梗；萼片5，倒披针形至近匙形或线状披针形，长3毫米，宽1毫米，先端钝，基部稍狭；花瓣5，线状披针形，长5毫米，宽1.5毫米，先端近渐尖，中央有1脉；雄蕊10，花丝长4毫米，花药长0.8毫米；鳞片5，横宽，有微缺；心皮5，长圆形，长2毫米，宽1.5毫米，花柱短，下部合生，上部叉开的。蓇葖星芒状排列，种子多数；种子长圆形，长0.8毫米，宽0.3毫米，棕黄色，有微乳头状突起。果期8月。

产我国台湾宜兰、台中、花莲港。生于海拔3000—3500米的山地石上。模式标本采自台湾台北县能高山。

117. 北京景天

Sedum pekinense Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Agr. Sci. Sarthe 39; 318. 1904, et in Repert. Sp. Nov. 6; 373. 1909; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 30; 291. 1970.

根颈木质，有多数花枝。枝矮小，高8厘米。叶扁平，宽。花红色？排成聚伞花序；萼片较花瓣为短；花瓣渐尖，与雄蕊几同长；心皮5，渐尖向稍长的花柱。花期8—9月。

产河北涿鹿县西灵山。据模式标本碎片，可能为或近小从红景天。

118. 叶花景天 (拉汉种子植物名称)

Sedum phyllanthum Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Agr. Sci. Sarthe 39; 1904, et in Repert. Sp. Nov. 6; 373. 1909; Leuener in Not. Bot. Gard. Edinb. 30; 292. 1970.

植株有多数茎而铺散，茎斜升。叶线形，近圆柱形。聚伞花序，花黄色；苞片长；萼片