

花瓣全缘,长7.5—8.5毫米,宽4—4.5毫米;萼片宽长圆形。花期10月。

产西藏南部工布江达。生于海拔2500米处山谷岩上。模式标本采自西藏南部康坡。未见标本,据原始文献编译。

4. 有柄红景天(植物分类学报增刊)

Rhodiola petiolata (Fröd.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 118. 1965.——*Sedum petiolata* Fröd. in Kew Bull. Misc. Inf. 1937: 96. 1937.

多年生草本,无毛。根颈短粗。基生叶长三角状线形,长达17毫米,先端渐尖,或宽线形,长6—7毫米,先端稍宽,钝。花茎长3—4厘米,直立,不分枝,细弱;下部叶有长柄,柄长15毫米,叶片肾圆形,长15毫米,钝;中部及上部的叶未见。伞房状花序;苞片线状披针形,长4毫米;萼片5,近长圆状三角形,长4毫米,先端渐尖,基部不具距;花瓣5,白色,近卵形,长6—7毫米,上部有微牙齿,先端有短尖;雄蕊10,长4.5—5毫米,对瓣的在基部上1毫米处着生;鳞片5,有长柄,长1毫米,宽0.4毫米,先端增宽,钝;心皮5,直立,卵形,长4毫米,有长花柱;种子未熟。花期9月。

产西藏。生于在海拔4300米处。未见标本,根据原记载描述。

组3. 异鳞红景天组——Sect. *Smithia* (H. Ohba) S. H. Fu, 东北林学院植物研究室汇刊 6: 75. 1980.——*Sedum* L. subgen. *Rhodiola* (L.) H. Ohba sect. *Smithia* H. Ohba in Ohashi, Fl. E. Himal. 3rd. rep. 295. 1975.——*Sedum* L. Sect. *Rhodiola* (L.) Scop. Subsekt. *Eurhodiola* § 2. *Himalensia* Berger in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 18a: 442, 1930, p. p., quoad *S. smithii* tantum.——*Sedum* L. sect. 1. *Rhodiola* (L.) Scop. group 1. *Primuloides* (Praeg.) Fröd. in Act. Hort. Gothob. 5. Append.: 21. 1930, p. p., quoad *S. smithii* tantum.——*Rhodiola* L. sect. 2. *Chamaerhodiola* Fisch. et Mey. ser. 4. *Megalanthae* (Fröd.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 122. 1965, p. p., quoad *R. smithii* tantum; *Rhodiola* L. subgen. *Primuloides* (Praeg.) H. Ohba sect. *Smithia* (H. Ohba) H. Ohba in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo III. 12: 185. 1978; l. c. 374. 1980.

基生叶不发达。根颈上鳞片2型,大的鳞片先端有附属物,附属物线形或长圆形,长1.5—3毫米,宽0.3—0.8毫米,有两性花,花药底着。

模式种及单一种: 异鳞红景天 *R. smithii* (Hamet) S. H. Fu

5. 异鳞红景天 藏布红景天、史密红景天(植物分类学报增刊) 图版34: 1—7

Rhodiola smithii (Hamet) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 122. 1965; H. Ohba in Journ. Jap. Bot. 54: 61. 1979; id. in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo III. 12: 374. f. 14, 22. 1980.——*Sedum smithii* Hamet in Bot. Jahrb. 50: Bei-