

0.6—0.8 毫米,先端不整齐微凹的;雌花心皮长5—6 毫米,基部1 毫米合生,直立,花柱长1—1.3 毫米,每室有胚珠18 粒。花期8 月初。

产云南西北部的贡山、德钦之间,海拔4300—4400 米(模式产地)。未见标本,根据文献描述。

38. 狭叶红景天 (植物分类学报增刊) 狮子七、狮子草、九头狮子七、涩疙瘩(秦岭植物志),高壮景天(拉汉种子植物名称),长茎红景天(植物分类学报增刊)

*Rhodiola kirilowii* (Regel) Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. 9: 472. 1859; A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 34. 1939; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 30: 291. 1970; 中国高等植物图鉴 2: 81. 图 1891. 1972; 秦岭植物志 2 卷 2 册: 411. 图 353. 1974. — *Sedum kirilowii* Regel in Regel et Tiling, Fl. Ajan 92, in adnot. no. 114. 1858, et in Nuov. Mém. Soc. Nat. Mosc. 11: 92. 1859; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 29: 128. 1883; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 34. f. 8, excl. f. 9. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 40. pl. 14. f. 133, p. p. excl. syn. 1930. — *Sedum caerulans* Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Agr. Sarthe 39: 318. 1904; in Repert. Sp. Nov. 6: 373. 1909. — *Sedum longicaule* Praeg. in Journ. Bot. 55: 39. 1917; id. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 39. f. 10. 1921. — *Sedum kirilowii* Regel var. *altum* Fröd. in Acta Hort. Gothob. 1: 23. pl. 11: 1. 1924. — *Rhodiola longicaulis* (Praeg.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 124. 1965.

38a. 狭叶红景天 (原变种) 图版 39: 7—12

*Rhodiola kirilowii* (Regel) Maxim. var. *kirilowii*

多年生草本。根粗,直立。根颈直径1.5 厘米,先端被三角形鳞片。花茎少数,高15—60 厘米,少数可达90 厘米,直径4—6 毫米,叶密生。叶互生,线形至线状披针形,长4—6 厘米,宽2—5 毫米,先端急尖,边缘有疏锯齿,或有时全缘,无柄。花序伞房状,有多花,宽7—10 厘米;雌雄异株;萼片5 或4,三角形,长2—2.5 毫米,先端急尖;花瓣5 或4,绿黄色,倒披针形,长3—4 毫米,宽0.8 毫米;雄花中雄蕊10 或8,与花瓣同长或稍超出,花丝花药黄色;鳞片5 或4,近正方形或长方形,长0.8 毫米,先端钝或有微缺;心皮5 或4,直立。蓇葖披针形,长7—8 毫米,有短而外弯的喙;种子长圆状披针形,长1.5 毫米。花期6—7 月,果期7—8 月。

产西藏、云南、四川、新疆、青海、甘肃、陕西、山西、河北。生于海拔2000—5600 米的山地多石草地上或石坡上。缅甸也有。模式标本采自北京百花山。

根颈药用,可止血、止痛、破坚、消积、止泻。主治风湿腰痛、跌打损伤。孕妇禁用。现知 *Sedum caerulans* Lévl. et Vant. 应并入红景天 *R. rosea* L.

38b. 宽狭叶红景天 (变种) 狭叶红景天宽叶变种(植物分类学报增刊)