

系的模式种：柴胡红景天 *Rhodiola bupleuroides* (Wall. ex Hk. f. et Thoms.) S. H. Fu。

3 种，产尼泊尔、锡金、不丹以及我国。我国有 3 种。

分 种 检 索 表

1. 植株被腺毛……………41. 紫绿红景天 *R. purpureoviridis* (Praeg.) S. H. Fu
1. 植株不被腺毛。
 2. 根颈斜升或近直立；叶下面略带苍白色；雄花瓣长 5—6 毫米，宽 1.7—2 毫米，雌花瓣长 3—4 毫米，宽 0.9—1.2 毫米……………42. 异色红景天 *R. discolor* (Franch.) S. H. Fu
 2. 根颈直立；叶下面不呈苍白色；雄花瓣长 2.8—4 毫米，宽 1.2—1.6 毫米，雌花瓣长 1.5—3 毫米，宽 0.5—0.7 毫米……………43. 柴胡红景天 *R. bupleuroides* (Wall. ex Hk. f. et Thoms.) S. H. Fu

41. 紫绿红景天 (植物分类学报增刊) 紫绿景天 (拉汉种子植物名称) 图版 40: 1—5


Rhodiola purpureoviridis (Praeg.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 125. 1965.——*Sedum purpureoviride* Praeg. in Journ. Bot. 55: 39. 1917; id. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 46. f. 15. 1921.——*Sedum bupleuroides* Wall. ex Hk. f. et Thoms. var. *purpureoviride* (Praeg.) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 45. 1930.

多年生草本。根颈直立，粗，直径可达 2 厘米，分枝，先端被三角形鳞片。花茎少数，直立，高 15—40 厘米，密被腺毛。叶互生，多，狭长圆状披针形，长 2.5—6 厘米，宽 3—10 毫米，先端稍急尖，基部圆，边缘有疏牙齿，常反卷，中脉显著，叶下面有腺毛。伞房状花序伞形，有多花，有苞片；雌雄异株；花梗长，被腺毛；萼片 5，线状披针形，长 1—2.5 毫米；花瓣 5，绿色，线状倒披针形，长 3—4 毫米；雄蕊 10，长 2.5—3.5 毫米，花丝紫色，花药圆形；鳞片 5，长方状楔形，长 1.5 毫米，宽 0.5 毫米，先端有微缺；心皮 5，披针形，直立，长 3 毫米。蓇葖长 6 毫米，有外弯的喙。花期 6—8 月。

产云南西北部及四川西部。生于海拔 2500—4100 米的山地草坡上或林边。模式标本采自云南西北部。

42. 异色红景天 (植物分类学报增刊) 异色柴胡景天 (拉汉种子植物名称) 图版 38: 18—22

Rhodiola discolor (Franch.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 124. 1965.——*Sedum discolor* Franch. in Journ. de Bot. 10: 285. 1896; Praeg. in Not. Bot. Gard. Edinb. 13: 78. pl. 173. emend. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 1: 29. 1924; H. Ohba in Ohashi, Fl. E. Himal. 3rd, rep. 327. pl. 10c, f. 45. 1975.——



1—5. 紫绿红景天 *Rhodiola purpureoviridis* (Præg.) S. H. Fu: 1. 花枝; 2. 萼片; 3. 花瓣及雄蕊; 4. 鳞片; 5. 心皮。6—11. 粗茎红景天 *Rhodiola wallichiana* (Hk.) S. H. Fu var *wallichiana*: 6. 花枝; 7. 叶; 8. 萼片; 9. 花瓣及雄蕊; 10. 鳞片; 11. 心皮。12—16. 宽果红景天 *Rhodiola eurycarpa* (Fréd.) S. H. Fu: 12. 花枝; 13. 萼片; 14. 花瓣及雄蕊; 15. 鳞片; 16. 心皮。17—21. 长圆红景天 *Rhodiola forrestii* (Hamet) S. H. Fu: 17. 花枝; 18. 雌花萼片; 19. 花瓣及雄蕊; 20. 鳞片; 21. 心皮。(钱存源绘)