

分 种 检 索 表

1. 根颈细, 横走。

2. 花两性……………44. 粗茎红景天 *R. wallichiana* (Hk.) S. H. Fu

2. 花单性, 雌雄异株……………45. 宽果红景天 *R. eurycarpa* (Fröd.) S. H. Fu

1. 根颈短粗, 不为横走的。

3. 植株不被乳头状突起。

4. 花瓣线状披针形, 雄蕊与花瓣同长或稍长……………

……………46. 兴安红景天 *R. stephanii* (Cham.) Trautv. et Mey.

4. 花瓣披针形或长圆状披针形, 雄蕊长为花瓣的 1.5 倍……………47. 羽裂红景天 *R. pinnatifida* A. Bor.

3. 植株上部有乳头状突起。

5. 叶有锯齿或浅裂……………48. 大果红景天 *R. macrocarpa* (Praeg.) S. H. Fu

5. 叶全缘, 或少有具浅锯齿……………49. 大鳞红景天 *R. macrolepis* (Franch.) S. H. Fu

44. 粗茎红景天 (植物分类学报增刊) 豺帚(改订植物名汇), 粗干景天(拉汉种子植物名称)

Rhodiola wallichiana (Hk.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 125. 1965; H. Ohba in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo III. 12: 394. f. 34c, d, 35e—h, 36—38. 1980.——*Sedum wallichianum* Hk. Icon. pl. 7: pl. 604. 1844; Weibel in Candollea 16: 145. 1957—58; H. Ohba in Ohashi, Fl. E. Himal. 3rd. rep. 313. f. 42l—o. 1975.——*Sedum crassipes* Wall. Cat. no. 7234. 1830. nom. nud.; Hk. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 99. 1858; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 29: 127. 1883. sub nota; Praeg. in Journ. Roy. Hort. Soc. London 46: 55. f. 20, 21. 1921; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 33, p. p., excl. varr., quoad pl. 10: 1—5. f. 96—101. 1930.——*Chamaerhodiola crassipes* (Wall. ex Hk. f. et Thoms.) Nakai, Rep. First Sci. Exped. Manch. Sect. IV. Pt. 1: 30. 1934.——*Rhodiola crassipes* (Wall. ex Hk. f. et Thoms.) A. Bor. in Kom. Fl. URSS. 9: 476. sub nota. 1939.

44a. 粗茎红景天 (原变种) 图版 40: 6—11

Rhodiola wallichiana (Hk.) S. H. Fu var. *wallichiana*

多年生草本。根颈横走, 分枝少, 直径约 1 厘米。老的花茎不残留或少数残留。花茎少数, 有 3—5 个, 高 17—25 厘米。叶多数, 线状倒披针形至披针形, 长 12—16 毫米, 宽 2—3 毫米, 两端渐狭, 无柄, 两侧上部各有 1—3 个疏锯齿。花序伞房状, 顶生, 有叶, 宽 1.5—2.5 厘米; 花两性, 少有单性异株的; 萼片 5, 线形, 长 3—8 毫米, 钝; 花瓣 5, 淡红色或淡绿色或黄白色, 倒卵状椭圆形, 长 5—10 毫米, 宽 2 毫米, 钝; 雄蕊 10, 长 8—12 毫米; 鳞片 5, 近匙状正方形, 长宽各约 1 毫米, 先端稍宽, 有微缺; 心皮 5, 直立, 椭圆状披针形,