

Hort. Soc. London 46: 73. f. 32—34. 1921.——*Sedum yunnanense* Franch. var. *oxyphyllum* Fröd. in Acta Hort. Gothob. 15: 13. 1942.

多年生草本。根颈粗，长，直径可达2厘米，不分枝或少分枝，先端被卵状三角形鳞片。花茎单生或少数着生，无毛，高可达100厘米，直立，圆。3叶轮生，稀对生，卵状披针形、椭圆形、卵状长圆形至宽卵形，长4—7(—9)厘米，宽2—4(—6)厘米，先端钝，基部圆楔形，边缘多少有疏锯齿，稀近全缘，下面苍白绿色，无柄。聚伞圆锥花序，长5—15厘米，宽2.5—8厘米，多次三叉分枝；雌雄异株，稀两性花；雄花小，多，萼片4，披针形，长0.5毫米；花瓣4，黄绿色，匙形，长1.5毫米；雄蕊8，较花瓣短；鳞片4，楔状四方形，长0.3毫米；心皮4，小；雌花萼片、花瓣各4，绿色或紫色，线形，长1.2毫米，鳞片4，近半圆形，长0.5毫米；心皮4，卵形，叉开的，长1.5毫米，基部合生。蓇葖星芒状排列，长3—3.2毫米，基部1毫米合生，喙长1毫米。花期5—7月，果期7—8月。

产西藏、云南、贵州、湖北西部、四川。生于海拔2000—4000米的山坡林下。模式标本采自四川飞越岭。

全草药用，有消炎、消肿、接筋骨之效。

52. 圆叶红景天 (植物分类学报增刊)

Rhodiola rotundifolia (Fröd.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 126. 1965.
——*Sedum yunnanense* Franch. var. *rotundifolia* Fröd. in Acta Hort. Gothob. 10. Append.: 160. pl. 111; 2. 1935.

多年生草本。主轴粗，先端被卵状三角形的鳞片。花茎单生，直立，高45—70厘米，秆棕色。3叶轮生或茎上部叶对生，圆形，或稍伸长或稍扁，长2—10厘米，宽2—8厘米，先端钝或急尖，基部圆，无柄，边缘有疏钝锯齿，叶下面带苍白色。花序聚伞圆锥状，长达13厘米；花瓣4—5，黄色；心皮长3毫米，花柱长，弯曲。花期8月。

产云南丽江东山(模式产地)、鹤庆，生于海拔3500—4300米的山坡杂木林下。

53. 菱叶红景天 豌豆七(植物分类学报增刊)，一代宗(中国高等植物图鉴)，白三七、打不死、还阳参、接骨丹、三步接骨丹(秦岭植物志)，还阳参景天(拉汉种子植物名称)，岩还阳、岩老鼠、岩田三七、岩见血参、岩豌豆、水三七(湖北植物志) 图版 42: 1—5

Rhodiola henryi (Diels) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 126. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 82. 图 1893. 1972; 秦岭植物志 2 卷 2 册: 412. 图 354. 1974; 湖北植物志 2: 57. 图 758. 1979. *Sedum henryi* Diels in Bot. Jahrb. 29: 361. 1900.
——*Sedum yunnanense* Franch. var. *henryi* (Diels) Hamet in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 145. 1913; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 48. 1930.——*Sedum sinicum* Diels in Bot. Jahrb. 29: 361. 1900.——*Rhodiola sinica* (Diels) Jacobsen, Sukkul. Lex. 291. 1970.