

rep. 333. 1975, sub syn.——*Sedum linearifolium* Royle var. *sinuatum* (Royle ex Edgew.) Hamet in Acta Hort. Gothob. 2: 394. 1926; Fröd. in l. c. 10. Append.: 52. pl. 19. f. 184—188. 1930.

多年生草本。根长。根颈先端被鳞片。花茎直立或匍匐，高达15厘米，无毛或被微乳头状突起，全部着叶。叶互生，外观椭圆形或倒卵形，长5—7厘米，宽2—4厘米，2—3羽状深裂或全裂，基部渐狭，裂片线形，宽1.5—3毫米，无毛。花序伞房状，高1.5厘米，宽2.5厘米，花密集，聚伞状着生；花有梗或无，花梗被微乳头状突起；花两性；萼片5，狭三角状线形，长3毫米；花瓣5，绿白色，椭圆形，长6毫米，宽2毫米，全缘；雄蕊10，对萼的长5毫米，对瓣的长4毫米，着生在基部上1毫米处；鳞片5，近正方形，长0.4毫米，宽0.3毫米，先端稍宽，截平或稍凹；心皮5，狭披针形，长3.5毫米，直立，花柱短。蓇葖直立，长6毫米，喙长1毫米；种子卵状长圆形，长0.8毫米，一侧及两端有狭翅，褐色。花期8月，果期10月。

产在西藏及云南中甸。生于海拔3200—4300米的山坡岩缝中及流石山坡上。模式标本采自西喜马拉雅地区。巴基斯坦、印度、尼泊尔也有。

56. 巴塘红景天 藏南红景天(植物分类学报增刊)

*Rhodiola tieghemii* (Hamet) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 127. 1965.——*Sedum tieghemii* Hamet in Bull. Soc. Bot. France 55: 711. 1908, "tieghemi".——*Sedum linearifolium* Royle var. *tieghemii* (Hamet) Hamet in Acta Hort. Gothob. 2: 395. 1926; Fröd. in l. c. 5. Append.: 53. f. 199—202. 1930.

多年生草本。根颈短，肉质。花茎直立，高8—11厘米，不分枝，无毛，先端有微乳头状突起。叶沿花茎全部着生，互生，有柄，长圆形，长1—3厘米，宽5—2.5厘米，先端钝，边缘有深圆齿或羽状浅裂，基部急狭入于叶柄，叶柄长1.5—2厘米，边缘有微乳头状突起。伞房花序，花紧密；花梗短，被微乳头状突起；苞片线形，长8—11毫米；花两性；萼片5，三角状线形，长6毫米，基部宽1.5毫米，边缘有时有微乳头状突起；花瓣5，狭长圆形至椭圆形，长5.5—8.5毫米，宽2.5—4.3毫米，上部边缘啮蚀状；雄蕊10，对瓣的长2.5—3毫米，着生基部上2毫米处，对萼的长6毫米；鳞片5，宽四方形，长0.4毫米，宽0.5毫米，先端有微缺；心皮5，狭披针形，直立，长6.5毫米，花柱长1.5毫米在内。花期9月。

产四川西部巴塘(模式产地)及西藏东部。

57. 圣地红景天 全瓣红景天(植物分类学报增刊)，圣景天(拉汉种子植物名称)

*Rhodiola sacra* (Prain ex Hamet) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 127. 1965.——*Sedum sacrum* Prain ex Hamet in Acta Hort. Gothob. 2: 395. 1926. pro syn.; Ohba in Ohashi, Fl. E. Himal. 3rd. rep. 342. f. 48f—i. 1975.——*Sedum linearifolium* Royle var. *sacrum* (Prain ex Hamet) Hamet in Acta Hort. Gothob.