

花茎上升或近直立,不分枝,高5—25厘米。叶聚生枝顶端,有柄,长圆形至椭圆形,长3—5厘米,宽1.2—2.5厘米,先端钝,基部渐狭,下延于长达1.5厘米的叶柄,边缘有3—4个浅裂至中裂,裂片有时再有1个钝锯齿。两歧聚伞花序长宽各2厘米,花紧密;花两性;萼片5,卵状三角形,长1毫米,先端圆;花瓣5,绿白色,狭长圆状卵形,长5毫米,宽1.5毫米,全缘;雄蕊10,与雄蕊同长或稍短;鳞片5,长方形,长0.5毫米,先端平或有微缺;心皮5,长4—5毫米,直立,花柱长1毫米。花期7—9月。

产我国西藏(错那)。尼泊尔、锡金、不丹、缅甸西北部也有。生于海拔2700—4200米的山坡石上或树干上苔藓丛中。模式标本采自锡金及不丹。

60b. **线萼红景天** (变种) 卵萼红景天秦氏变种(植物分类学报增刊) 图版 43:6—10

Rhodiola ovatisepala (Hamet) S. H. Fu var. **chingii** S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 128. 1965.

萼片线形,长6—8毫米,宽1毫米。花期6—8月,果期9—10月。

产西藏东南部、云南西北部及乌蒙山区。生于海拔3000—3900米处山坡林下或山崖石上。模式标本采自云南鹤庆。

61. **川西红景天** (植物分类学报增刊)

Rhodiola dielsiana (Limpr. f.) S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 128. 1965. —*Sedum dielsianum* Limpr. f. in Pax in Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 392. 1922. —*Sedum linearifolium* Royle var. *dielsianum* (Limpr. f.) Hamet in Acta Hort. Gothob. 2: 395. 1926; Fröd. in l. c. 5. Append.: 53. 1930.

植株细弱。根颈长10—15厘米,倾斜;鳞片卵状线形。花茎1—2,高3—6厘米。叶聚生枝顶,近轮生,有柄,羽状半裂,裂片羽状分裂。花序伞房状,花1—3;两性;萼片宽三角形,长2—2.5毫米,宽0.7—1毫米;花瓣白色,卵状披针形,长5—7毫米,宽1.6—1.7毫米,先端渐尖,全缘;雄蕊与花瓣稍同长。

产四川西部。生于海拔3800米处。未见标本,根据原记载描述。模式产地为四川西部。H. Ohba in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo III. 12: 380. 1980, 将本种并入菊叶红景天 *R. chrysanthemifolia* (Lévl.) S. H. Fu 因未见标本,留待以后研究。

62. **六叶红景天** (植物分类学报增刊)

Rhodiola sexifolia S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 123. 1965.

花茎斜上,高18厘米,被微乳头状突起。6叶轮生,叶椭圆形长圆形,长4厘米,宽2.5厘米,羽状浅裂,裂片全缘,或有疏牙齿,先端钝,基部楔形,无柄,被微乳头状突起。伞房状花序,高3厘米,宽3—5厘米,花密生,被微乳头状突起,有苞片;苞片狭倒披针状线形,长6毫米,宽1.2毫米,被微乳头状突起;花两性;萼片5,线形,长3.5毫米,宽1—1.3毫米;花瓣5,披针形,长6.3—7毫米,宽2毫米,先端急尖,钝;雄蕊10,较花瓣稍短,