

Rhodiola staminea (O. Pauls.) S. H. Fu, comb. nov.——*Sedum stamineum* O. Pauls. in Sven Hedin, South. Tib. 6(3): 74. pl. 7. f. 3. text f. 5, 6. 1922.

多年生草本,无毛。根颈直立,短粗,先端被鳞片。花茎直立或倾斜,高4—6厘米,上部着生叶。叶疏生,卵状线形,下部的叶长7毫米,基部斜圆形,有3脉,上部叶基部狭。花序伞形,有多花(多至有17花),花梗短或极短;花两性;萼片5,三角状线形,长3毫米,基部合生;花瓣5,长圆形或卵状披针形,长5毫米;雄蕊10,较花瓣稍长;鳞片横长方形,先端有圆齿;心皮5,有短花柱,花柱反曲。花期7月。

产我国西藏西南部,雅鲁藏布江上游海拔5010米的山地。模式标本采自西藏。未见标本,根据原记载描述。

Fröderström in Acta Hort. Gothob. 5. Append.: 34. 1930, sub syn., 将本种列为 *Rhodiola algida* (Ledeb.) Fisch. et Mey. 的异名,确否待证。

73. 东疆红景天

Rhodiola telephioides (Maxim.) S. H. Fu, 东北林学院植物研究室 6: 75. 1980.——*Sedum suboppositum* Maxim. var. *telephioides* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 133. 1883.

花茎高30厘米,稍带白粉霜,曲折的。叶开展,圆形或圆倒卵形,长1.5—3厘米,宽1.5—2.5厘米,先端不具短尖,基部圆形或心形,无柄。伞房花序直径1.5—2.5厘米,总梗长2.5厘米,不具叶;花多数,花梗较花短;花开放时直径6—7毫米;花各部与对叶红景天 *Rhodiola subopposita* (Maxim.) Jacobsen 相同,但雄蕊与花瓣等长或稍长;鳞片长为宽的一倍,先端有圆齿;雄花中心皮3—4,小,卵形,花柱极短或缺。

产我国新疆天山东部。生于海拔2700米的多石山坡。未见标本,根据原记载描述。模式标本采自新疆。

叶圆形而长达3厘米,可独立成种。