

111. 1916, p. p. — *S. hirculus* L. var. *indica* Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:392. 1878, p. p. — *S. montana* f. *humilis* H. Smith op. cit. 10. t. 6B. 1924; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 13. 1978; 云南种子植物名录上册: 241. 1984. — *S. montana* var. *splendens* H. Smith l. c. — *S. montana* H. Smith f. *densifolia* Ku in Bull. Bot. Res. 9(4):13. 1989.

多年生草本,丛生,高4.5—35厘米。茎疏被褐色卷曲柔毛。基生叶发达,具柄,叶片椭圆形、长圆形至线状长圆形,长0.5—3.4厘米,宽1.5—5.5毫米,先端钝或急尖,无毛,叶柄长0.7—4.5厘米,基部扩大,边缘具褐色卷曲长柔毛;茎生叶披针形至线形,长0.9—2.5厘米,宽1.5—5.5毫米,两面无毛或背面和边缘疏生褐色长柔毛,下部者具长0.3—2厘米之叶柄,上部者变无柄。聚伞花序长1.4—4厘米,具2—8花,稀单花;花梗长0.4—1.8厘米,被褐色卷曲柔毛;萼片在花期直立,近卵形至近椭圆形,长3.8—5毫米,宽2—3.3毫米,先端钝圆,腹面无毛,背面有时疏生柔毛,边缘具卷曲长柔毛,5—8脉于先端不汇合;花瓣黄色,倒卵形、椭圆形、长圆形、提琴形至狭倒卵形,长8—12.5毫米,宽3.3—6.9毫米,先端钝圆或急尖,基部具0.2—0.9毫米之爪,5—15脉,基部侧脉旁具2痂体;雄蕊长4—6毫米,花丝钻形;子房近上位,长3.3—5毫米,花柱2,长1.1—2.5毫米。花果期5—10月。

产陕西(太白山)、甘肃南部、青海(海东、海北、黄南、海南、玉树、果洛等州)、四川西部、云南西北部及西藏东部和南部。生于海拔2700—5300米的灌丛、高山草甸、高山沼泽化草甸和高山碎石隙。不丹至克什米尔地区也有。合模式标本采自四川松潘(黄龙寺)和马尔康(马塘)。

花入药,治头痛、神经痛等。

35. 山羊臭虎耳草(植物分类学报)

Saxifraga hirculus L. Sp. Pl. ed. 1. 1:402. 1753; Don in Trans. Linn. Soc. 13:372. 1821; Ser in DC. Prodr. 4:44. 1830; Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. 2:69. 1857; Engl. Monogr. Gatt. Saxifr. 122. 1872.; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:392. 1878; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117): 110. 1916; A. Los. in Kom. Fl. URSS 9:160. 1939; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 13. 1972; 中国高等植物图鉴补编 2: 29. 1983; 云南种子植物名录上册: 239. 1984. — *S. hirculus* L. var. *typica* Clarke l. c.; Engl. et Irmsch. op. cit. 111. 1916, p. p. — *S. hirculus* L. var. *typica* f. *major* Engl. et Irmsch. l. c. — *S. hirculus* L. var. *typica* f. *intermedia* Engl. et Irmsch. l. c. — *S. hirculus* L. var. *major* (Engl. et Irmsch.) J. T. Pan in C. Y. Wu, Index Fl. Yunnan. 1:239. 1984, nom. nud. et in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 2:480. f. 159:1—8. 1985.

35a. 山羊臭虎耳草(原变种) 图版 20:25—31

var. *hirculus*