

生于茎顶,或聚伞花序具2花;花梗长1.2—3厘米,被褐色腺毛并杂有褐色卷曲长腺毛;萼片在花期直立至开展,卵形至近椭圆形,长约4毫米,宽约2.5—2.8毫米,先端啮蚀状,边缘膜质,腹面无毛,背面被腺毛,5脉于先端不汇合;花瓣橙黄色,椭圆形至卵形,长5.5—5.6毫米,宽约3.5毫米,先端钝圆,基部具长0.3—0.5毫米之爪,5—7脉,基部侧脉旁具2痂体;雄蕊长3—3.5毫米,花丝钻形;子房阔卵球形,长约2.5毫米,花柱2,长约2.5毫米,叉开,柱头较大。花期7—8月。

产四川稻城。生于海拔4600米左右的高山灌丛草甸。模式标本采自四川稻城(贡嘎山)。

42. 日照山虎耳草(植物分类学报) 图版22:18—25

*Saxifraga rizhaoshanensis* J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 28(5): 386. 1990.

多年生草本,丛生,高6.5—7.4厘米。茎被黑褐色腺毛,下部还杂有卷曲长腺毛。基生叶密集,具柄,叶片纺锤状椭圆形至长圆形,长约2毫米,宽0.5—1.2毫米,先端急尖并具1褐色芒状毛(长约1毫米),腹面和边缘疏生柔毛,背面无毛,叶柄长2—2.5毫米,边缘具褐色卷曲长腺毛;茎生叶,下部者具柄,线状长圆形,长约6毫米,宽约1毫米,先端具1芒状毛,两面和边缘具粗毛(有时带腺头),叶柄长约2毫米,边缘具褐色卷曲长腺毛,中部以上者无柄,线形,长约6.6毫米,宽约1毫米,两面和边缘具黑褐色腺毛。聚伞花序具2花;花梗长10—17毫米,被黑褐色腺毛;萼片在花期直立至开展,卵形至阔卵形,长约2.5毫米,宽约1.6—2毫米,边缘膜质,通常无毛,先端啮蚀状,有时多少具黑褐色腺毛,腹面无毛,背面被黑褐色腺毛,3脉于先端不汇合;花瓣黄色,近长圆形,长约4.2毫米,宽约1.7毫米,先端急尖,基部狭缩成长约0.5毫米之爪,3脉,基部侧脉旁具2痂体;雄蕊长约2.4毫米,花丝钻形;子房近上位,卵球形,长约2毫米,花柱2,长约2毫米,叉开。花期7—8月。

产四川(乡城、得荣)。生于海拔4300—4450米的高山草甸和石隙。模式标本采自四川乡城(日照山)。

43. 金丝桃虎耳草(云南种子植物名录)

*Saxifraga hypericoides* Franch. in Journ. de Bot. 10: 261. 1896. — *S. macrostigma* Franch. var. *hypericoides* Engl. et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. 5(24): 132. 1912 et in Bot. Jahrb. 48: 572. f. 10—T. 1912 et in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117): 97. f. 170—Q. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 417. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 127. 1972; 云南种子植物名录上册: 240. 1984. — *S. hypericoides* Franch. f. *longipetala* Ku in Bull. Bot. Res. 9(4): 2. 1989. — *S. peplidifolia* Franch. var. *angustipetala* Ku l. c.

43a. 金丝桃虎耳草(原变种) 图版23:1—7