

毛;茎生叶约6枚,下部者与基生叶相似,具柄,向上则变无柄,卵状心形至卵形,长1.6—4.2厘米,宽0.6—3厘米,先端钝,基部心形(中部以上者兼抱茎),最上部者,腹面和边缘具黑褐色短腺毛,背面无毛,其他则两面和边缘均多少具腺柔毛。聚伞花序伞房状,长约6.5厘米,约具10花;花梗密被黑褐色短腺毛;萼片在花期开展,卵形,长3.2—3.3毫米,宽2—2.2毫米,先端钝,腹面无毛,背面和边缘具黑褐色短腺毛,3脉于先端不汇合;花瓣黄色,阔卵形至卵形,长约6毫米,宽4.1—4.2毫米,先端急尖或稍钝,基部稍心形且狭缩成长0.6—0.7毫米之爪,5—6脉,侧脉旁具4痂体;雄蕊长约4.6毫米,花丝钻形;子房近上位,阔卵球形,长约3毫米,花柱2,长约0.7毫米,粗壮。花期7—9月。

产四川(乡城)。生于海拔3750米左右的河滩草甸。模式标本采自四川乡城(无名山马熊沟)。

60. 优越虎耳草(中国高等植物图鉴)

Saxifraga egregia Engl. in Bull. Acad. Sci. St. -Petersb. **29**:113. 1883; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. **67** (IV. 117): 126. f. 27. 1916; 中国高等植物图鉴 **2**: 129. 图 1988. 1972; 西藏植物志 **2**: 476. 1985, excl. syn. — *S. diversifolia* Wall. ex Ser. *β. var. soulieana* Engl. et Irmsch. in Bot. Jahrb. **48**: 586. f. 8E—H. 1912 et in op. cit. 129. f. 29E—H. 1916; H. Smith in Acta Hort. Gothob. **1**: 12. 1924; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**(2): 421. 1931; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. **16**(2): 13. 1978; 云南种子植物名录上册: 237. 1984. — *S. zogangensis* Ku in Bull. Bot. Res. **9**(4): 13. 1989.

60a. 优越虎耳草(原变种) 图版 28:13—18

var. *egregia*

多年生草本,高9—32厘米。茎中下部疏生褐色卷曲柔毛(有时带腺头),稀无毛,上部被短腺毛(腺头黑褐色)。基生叶具长柄,叶片心形、心状卵形至狭卵形,长1.55—3.25厘米,宽1.2—2厘米,腹面近无毛,背面和边缘具褐色长柔毛(有时具腺头),叶柄长1.9—5厘米,边缘具卷曲长腺毛;茎生叶(3—)7—13枚,中下部者,其叶片心状卵形至心形,长1.15—2.6厘米,宽0.75—2厘米,先端稍钝或急尖,基部心形,腹面无毛或近无毛,背面和边缘具褐色长柔毛,叶柄长0.15—1.9厘米,具褐色卷曲长柔毛(有的具腺头),最上部者,其叶片披针形至长圆形,长0.88—1.6厘米,宽3—7毫米,先端急尖或稍钝,基部通常楔形至近圆形,两面被褐色腺毛或无毛,边缘具褐色卷曲长腺毛并杂有短腺毛,具长2—3毫米之柄。多歧聚伞花序伞房状,长1.9—8厘米,具3—9花;花序分枝长1—5.3厘米,具1—3花;花梗长0.4—6厘米,被短腺毛(腺头黑褐色);萼片在花期反曲,卵形至阔卵形,长2—3.8毫米,宽1.2—2毫米,先端钝,腹面无毛,背面和边缘具腺毛,3—6脉于先端不汇合;花瓣黄色,椭圆形至卵形,长5.3—8毫米,宽2.3—3.5毫米,先端钝或稍急尖,基部楔形至圆形,具长0.4—1.1毫米之爪,3—6(—7)脉,具(2—)4—6(—10)痂体;雄蕊长4—