

Irmsch. tantum.

组的后选模式种：景天虎耳草 *Saxifraga sediformis* Engl. et Irmsch.

我国有 6 系 48 种。

系 1. 小芽系——Ser. *Gemmuligerae* J. T. Pan in *Acta Phytotax. Sin.* **29**(1):14. 1991.——Sect. *Trachyphyllum* Gaudin, *Fl. Helv.* **3**: 85. 1828, p. p.

系的模式种：小芽虎耳草 *Saxifraga gemmuligera* Engl.

我国有 3 种。

105. 小芽虎耳草(植物分类学报) 邦参布柔(藏名) 图版 40:8—10

Saxifraga gemmuligera Engl. in *Bot. Jahrb.* **48**: 601. 1912 et in *Engl. pflanzenr.* **67**(IV. 117): 151. 1916; J. T. Pan in *Acta Phytotax.* **16**(2): 19. f. 4. 1978; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 31. 1983.——*S. unguiculata* a. *gemmuligera* Engl. in *Bull. Acad. Sci. St.-Petersb.* **29**: 116. 1883.

草本，高 4.5—17 厘米。茎不分枝，被腺毛，叶腋和苞腋具珠芽。基生叶密集，呈莲座状，叶片近匙形，长约 5 毫米，宽约 2 毫米，先端急尖，全缘，基部渐狭，两面无毛，边缘具刚毛状睫毛；茎生叶近长圆形至卵形，长 5.1—6.5 毫米，先端急尖且具短尖头，全缘，边缘具刚毛状睫毛或腺睫毛。花单生于茎顶；花梗被腺毛；萼片在花期反曲，卵形，长 1.5—1.9 毫米，宽 1.2—1.4 毫米，先端钝，腹面和边缘无毛，背面基部具腺毛，5 脉于先端不汇合；花瓣黄色，狭卵形，长约 4 毫米，宽 1.4—1.5 毫米，先端钝，基部狭缩成爪，3 脉，无疵体；雄蕊长 2.5—3 毫米，花丝钻形；子房卵球形，花柱 2。花期 6—8 月。


产青海大通河流域及黄南、果洛等州。生于海拔 3 500—4 250 米的高山草甸和水边石隙。模式标本采自夏哈日山。

全草入药；苦，寒；清热利肺。

106. 加查虎耳草(植物分类学报) 图版 40:11—16

Saxifraga sessiliflora H. Smith in *Bull. Brit. Mus. Bot.* **2**(4): 102. f. 3a—d. 1958; 西藏植物志 **2**: 500. 1985.——*S. brevicaulis* H. Smith l. c.——*S. gyacaensis* J. T. Pan in *Acta Phytotax. Sin.* **16**(2): 27. f. 11. 1978.

多年生草本，高 2—3 厘米。小主轴多分枝，具覆瓦状莲座叶丛；茎柔弱，被腺毛。莲座叶狭倒卵状匙形，长约 4 毫米，宽约 1.4 毫米，先端急尖，腹面凹陷，背面弓凸，仅边缘具刚毛状睫毛；茎生叶 3—4 枚，椭圆形，长约 3.3 毫米，宽约 1.8 毫米，先端急尖，两面无毛，边缘具刚毛状睫毛。花单生于茎顶；花梗长约 6 毫米，密被腺毛；苞片与茎生叶相似，长约 3.4 毫米，宽约 1.8 毫米；萼片在花期直立，卵形，长 3.1—3.8 毫米，宽 2—2.5 毫米，先端钝，两面无毛，边缘具刚毛状睫毛，3 脉于先端不汇合；花瓣白色，基部粉红色，阔椭圆形至阔卵形，长约 5.2 毫米，宽约 4 毫米，先端微凹，基部渐狭成长 1—1.2 毫米之爪，5 脉，无疵



1—7. 齿叶虎耳草 *Saxifraga hispidula* D. Don: 1. 全株, 2. 叶片, 3. 芽, 4. 花, 5. 萼片, 6. 花瓣, 7. 示花梗、雄蕊和雌蕊。8—10. 小芽虎耳草 *Saxifraga gemmuligera* Engl.: 8. 基生叶, 9. 萼片, 10. 花瓣。11—16. 加查虎耳草 *Saxifraga sessiliflora* H. Smith: 11. 植株一部分, 12. 莲座叶, 13. 基生叶, 14. 萼片, 15. 花瓣, 16. 示花梗、雄蕊和雌蕊。17—25. 刺虎耳草 *Saxifraga bronchialis* L.: 17. 植株一部分, 18. 莲座叶, 19. 基生叶, 20. 芽, 21. 花, 22. 萼片腹面, 23. 萼片背面, 24. 花瓣, 25. 示花梗、花丝和雌蕊。(潘锦堂、刘进军绘)