

2. 青铜钱 (云南种子植物名录)

Parnassia tenella Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. **2**: 80. 1858; Drude in Linnaea **39**: 323. 1875; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 403. 1878; Franch. in Bull. Soc. Bot. France **44**: 251. 1897; Delavay. in Journ. Linn. Soc. Bot. **39**: 473. 1911; W. W. Smith in Rec. Bot. Surv. India **4**: 370. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** (2): 434. 1931, et, in Oesterr. Bot. Zeitschr. **90**: 129. 132. 1941; Hara in Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal **2**: 156. 1979; Ku in Bull. Bot. Res. North-East. For. Univ. **7** (1): 23. 1987.

矮小细弱草本，高 5—11 厘米。根状茎短粗，其上常有宿存膜质褐色鳞片，下部生出很多纤细之根。基生叶 1—2 片，有细弱长柄；叶片肾形，长 8—25 毫米，宽 13—30 毫米，先端圆，常微凹，具小而突起尖头，基部深心形，边全缘，呈薄的一圈窄膜，并起伏不平向外反卷，上面深绿色，下面淡绿色，有明显弧形脉，被紫色小点，干后不明显；叶柄长 2—8 厘米，扁而两侧带窄翼，具棱条；托叶膜质，大部贴生于叶柄，边有褐色流苏毛，早落。茎 1，稀 2，通常近中部或偏上具 1 茎生叶，茎生叶无柄半抱茎，肾形，长 2—4 毫米，宽 3—5 毫米。花单生于茎顶，直径 5—15 毫米；萼筒陀螺状；萼片半圆形至卵形，长 3—5 毫米，先端圆，边缘膜质，啮蚀状，有紫色小斑点，为花瓣长度的 1/3；花瓣绿色，扇形，长 4—8 毫米，宽 3—6 毫米，先端圆，基部楔形，有长 3—5 毫米的短爪，边缘膜质，呈细密地啮蚀状或具齿，具平行脉 5—7 条，疏生紫色细密小斑点；雄蕊 5，花丝扁平，向基部扩大，长 4—6 毫米，花药长圆形，近侧生，纵裂，雄蕊长度仅为花瓣长度 1/5；退化雄蕊 5，为雄蕊长度的 1/2，锤状，顶端不裂，偶有极小圆齿，柄硬直，比头部长；子房球形，有紫色小斑点，上位，花柱极短，长约 1 毫米，柱头 3 裂。蒴果宽倒心形，具 3 棱，呈 3 翅状，3 裂；种子长圆形，多数，种皮褐色。花期 8 月，果期 9 月开始。

产云南西北部、四川西部。生于杂木林下或林边，海拔 2800—3400 米。尼泊尔、锡金也有分布。模式标本采自锡金。

本种植株矮小；花瓣绿色，扇形，很易识别。

3. 窄瓣梅花草 (植物研究)

Parnassia angustipetala Ku in Bull. Bot. Res. North-East. For. Univ. **7** (1): 23. pl. 1. fig. 1—6. 1987. — *P. yunnanensis* Franch. var. *angustipetala* Jien in sched.

矮小草本，高 2.5—4 厘米。根状茎粗壮，长圆形或块状，其上有残存褐色鳞片，周围生出多数长而丝状的根。基生叶丛生，6—9 片，具柄；叶片多为卵状心形，长 5—7 毫米，宽约 4 毫米，先端圆，基部心形，有时近截形，全缘，周围薄，呈一圈窄膜质，上面深绿色，下面淡绿色，基部有不明显 3 条脉；叶柄长可达 1 厘米，扁平，柔弱，近似膜质，常有褐色斑点；托叶膜质，贴生于叶柄上，边常呈褐色流苏状，早落。茎 1，通常