

侧近中部伸出。

本系的模式种：粉红溲疏 *D. rubens* Rehd.

本系有下列 3 种。

4. 粉背溲疏 (经济植物手册)

Deutzia hypoglauca Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 24. 1911 et in Journ. Arn. Arb. 5: 158. 1924 p. p. et in Man. Cult. Trees & Shrubs 289. 1927; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 937. 1912; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 6. 1924; Bean, Trees & Shrubs ed. 7, 1: 612. 1950; 胡先骕, 经济植物手册, 上册, 497. 1955; Krüssmann, Laubgeh. ed. 2, 134. 1951 et Handb. Laubgeh. 1, 6: 394. 1960; Zaikonn. in Bot. Журн. СССР 47 (2): 207. 1962 et Дейщин-Декорат. Куст. (Моногр. *Deutzia*) 22. fig. 1 (8). 2 (9). 3 (3). 1966; 中国高等植物图鉴 2: 97. 1972; 秦岭植物志 1 (2): 461. 图 394. 1974; 湖北植物志 2: 102. 图 831. 1979. — *D. rubens* auct. non Rehd.; Airy-Shaw in Curtis's Bot. Mag. 157. tab. 9362. 1934 p. p.

4a. 粉背溲疏 (原变种) 图版 10: 1—6

var. *hypoglauca*

灌木, 高约 2.5 米; 老枝浅灰色或浅褐色, 表皮常片状脱落; 花枝长 8—14 厘米, 具 4—8 叶, 紫红色, 无毛。叶膜质或近纸质, 卵状披针形或椭圆状披针形, 长 7—9 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 先端渐尖, 基部圆形或阔楔形, 边缘具细锯齿, 上面疏被 3—5 辐线星状毛, 下面无毛, 灰绿色, 具白粉; 叶柄长 2—5 毫米, 稍紫红色。伞房花序直径 3—6 厘米, 有花 5—15 朵; 花序梗和花序轴均无毛; 花蕾球形或倒卵形, 花冠直径 1.5—2 厘米; 花梗长 5—15 毫米; 萼筒杯状, 高约 2.5 毫米, 被 6—8 辐线星状毛, 裂片阔卵形, 较萼筒短, 外面被毛; 花瓣白色或先端稍粉红色, 倒卵形, 长 6—10 毫米, 宽 5—6 毫米, 先端圆形, 基部急收狭, 外面被星状毛; 花蕾时覆瓦状排列; 外轮雄蕊长 6—7 毫米, 花丝先端 2 齿, 花药具短柄, 生于花丝内侧裂齿间或稍下, 较花丝齿短或等长, 内轮雄蕊线形, 长 5—6 毫米, 先端钝或浅 2 裂, 花药生于花丝内侧近中部; 花柱 3, 与雄蕊近等长。蒴果半球形, 直径 3—4 毫米, 被毛。花期 5—7 月, 果期 8—10 月。2n=26。

产陕西西南部、甘肃、湖北西部、四川。生于海拔 1000—2200 米山坡灌丛中。模式标本采自湖北。

粉背溲疏分变种检索表

1. 叶下面灰绿色, 具白粉, 无毛 4a. 粉背溲疏 var. *hypoglauca* R.
1. 叶下面绿色, 无白粉, 被毛。
 2. 花较小, 花冠直径不及 10 毫米; 叶较小, 长 3—4 厘米, 宽 7—12 毫米 4b. 绿背溲疏 var. *viridis* S. M. Hwang