

产云南(大理、巍山、漾濞)、四川(九龙、攀枝花)、贵州(石阡)。生于海拔500—2000米山坡灌丛中。模式标本采自大理附近。

23. 刚毛溲疏

Deutzia setosa Zaikonn. Дефтинт-Декорат. Куст. (Моногр. *Deutzia*) 93. fig. 23 (4). 24 (3). 25. 1966. — *D. rehderiana* auct. non Schneid.; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7, 2: 439. 1931. p. p.

灌木, 稍攀援状; 老枝柔弱, 纤细, 无毛; 花枝长3—4厘米, 具2—4叶。叶纸质, 卵形或阔卵形, 长2—3厘米, 宽5—13毫米, 先端急尖或渐尖, 基部圆形, 边缘具细锯齿, 两面绿色, 上面被4(—5)辐线星状毛, 下面被5—6辐线星状毛, 常具中央长辐线, 侧脉每边2—3条; 叶柄长约1毫米, 被星状毛。聚伞花序长2—3厘米, 直径3—4厘米, 有花3—5朵; 花蕾卵状长圆形; 花冠直径1.2—1.5厘米; 花梗长3—8毫米; 萼筒杯状, 高约3毫米, 宽约2.5毫米, 密被5—9辐线星状毛, 毛稍紧贴表面, 裂片卵形或卵状长圆形, 长1—1.5毫米, 先端急尖; 花瓣白色, 椭圆形, 长6—7毫米, 宽3—4毫米, 花蕾时内向镊合状排列; 外轮雄蕊长约3毫米, 花丝先端2齿, 齿稍扩展, 长达花药, 花药卵形, 内轮雄蕊较短, 花丝先端稍2裂或近截形, 花药从花丝内侧中部伸出; 花柱3, 较雄蕊短。蒴果未见。花期5月。

产云南(大理)。生于海拔约1850米山坡灌丛中。模式标本采自大理。描述据原始记录。

本种模式标本未见, 但据采自云南江川侯宽昭74547号标本, 叶顶端短渐尖或急尖, 被毛上面4(—5), 下面5(—6)辐线星状毛等特征与原始记录相似, 但小枝有疣状体星状毛, 叶被毛无中央长辐线, 花萼裂片卵状长圆形, 较萼筒长, 与之不同。

24. 小聚花溲疏 图版16: 6—11

Deutzia cymuligera S. M. Hwang in Acta Bot. Aus. Sin. 8: 6. fig. 4. 1992.

灌木, 高约1.5米; 老枝紫褐色, 无毛; 花枝短缩, 长0.5—1厘米, 具2—4叶, 被紧贴星状毛。叶纸质, 卵形或椭圆状卵形, 长2—2.5厘米, 宽1—1.3厘米, 先端急尖或短渐尖而具小尖头, 基部阔楔形, 边缘具锯齿, 两面绿色, 上面被3(—4)辐线星状毛, 下面被4(—5)辐线星状毛, 毛较细, 彼此相邻接, 侧脉每边3—4条; 叶柄长约2毫米。伞房状聚伞花序长1.5—2.5厘米, 直径2—3厘米, 有花3—5朵; 花蕾卵状长圆形; 花冠直径1.2—1.5厘米; 花梗纤细, 长1—2厘米, 最下面的最长, 被星状毛; 萼筒杯状, 高约2.5毫米, 直径约3毫米, 裂片卵形, 长约1毫米, 被7—10辐线星状毛, 先端急尖; 花瓣白色, 椭圆形或阔椭圆形, 边缘皱波状, 长6—7毫米, 宽4—5毫米, 外面被3—7辐线星状毛, 花蕾时内向镊合状排列; 外轮雄蕊长约3毫米, 花丝先端2齿, 齿钝或尖, 较花药稍长, 花药卵形, 具短柄, 内轮雄蕊较短, 先端渐尖或不等浅2裂, 花药生于花丝内侧近中部; 花柱3, 长约3毫米。蒴果未见。花期5月。