

产四川（巫溪）。生于山谷阴湿处。

系 9. 短裂溲疏系 Ser. *Brevilobae* S. M. Hwang in Acta Phytotax. Sin. 31(2):112. 1993. — Sect. *Deutzia* Subsect. *Stenosepalae* Ser. *Stamineae* Zaikonn. Дейции-Декорат. Куст. (Моногр. *Deutzia*) 98. p. p.

花枝中等长或短缩；叶纸质，卵状披针形、卵形或椭圆状卵形，先端急尖或渐尖，基部圆形或阔楔形，下面密被多辐线星状毛；花萼裂片卵状披针形，较萼筒短；聚伞花序被星状毛，花柱较雄蕊短或近等长。

本系的模式种：短裂溲疏 *D. brevilobae* S. M. Hwang

本系有下列 4 种。

25. 钝裂溲疏 图版 16: 12—17

*Deutzia obtusilobata* S. M. Hwang in Acta Bot. Aus. Sin. 8: 4. fig. 3. 1992.

灌木，高约 1.5 米；老枝灰褐色，无毛，表皮片状脱落，花枝长 6—10 厘米，具 6—8 叶，红褐色，疏被星状毛。叶纸质，卵形或椭圆状卵形，长 2—4 厘米，宽 1.5—1.8 厘米，先端急尖而具小尖头，基部阔楔形或近圆形，边缘具疏离锯齿，上面绿色，稍粗糙，疏被（4—）5—8（—9）辐线星状毛，下面灰白色，密被（7—）8—11 辐线星状毛，毛被连续覆盖，侧脉每边 3—4 条；叶柄长 2—3 毫米，被星状毛。聚伞花序下部分枝具叶，长 5—8 厘米，直径 3—5 厘米，疏松，有花 9—15 朵；花蕾椭圆形；花冠直径约 1.5 厘米；花梗长 1—2 厘米，疏被星状毛；萼筒杯状，高约 2.5 毫米，直径约 3 毫米，裂片卵形或卵状三角形，长宽均约 1.5 毫米，与萼筒均密被 8—11 辐线星状毛；花瓣白色，长圆形或倒卵状椭圆形，长约 7 毫米，宽约 4 毫米，外面被星状毛，花蕾时内向镊合状排列；外轮雄蕊长约 4 毫米，花丝先端截形或具齿，齿半圆形，花药卵形，具短柄，较花丝齿长，内轮雄蕊长约 2 毫米，花丝先端稍 2 裂，花药从花丝裂齿间或内侧近顶端伸出；花柱 3，长约 3.5 毫米。果实未见。花期 3 月。

产四川（九龙）。生于海拔约 2000 米林中。模式标本采自九龙。


26. 维西溲疏（中国高等植物图鉴补编） 蒙氏溲疏（经济植物手册）

*Deutzia monbeigii* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 11: 205. 1919; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7 (2): 439. 1931; Turr. in Curtis's Bot. Mag. ser. 167, 4. tab. 123. 1950; 胡先骕，经济植物手册，上册：493. 1955; Zaikonn. Дейции-Декорат. Куст. (Моногр. *Deutzia*) 101. fig. 23 (7). 24 (8). 1966; 中国高等植物图鉴 2: 52. 1985.

26a. 维西溲疏（原变种） 图版 17: 1—7

var. *monbeigii*

灌木，高 1—1.5 米；老枝灰褐色，近无毛，表皮片状脱落；花枝长 3—8 厘米，具 4—6 叶，暗褐色，稍具棱，疏被星状毛。叶近革质，卵形或卵状椭圆形，长 1.5—3.5（—



图版 16 1—5. 灌丛溲疏 *Deutzia rehderiana* Schneid. 1. 花枝; 2. 叶上面示被毛; 3. 叶下面示被毛; 4. 外轮雄蕊; 5. 内轮雄蕊。6—11. 小聚花溲疏 *D. cymuligera* S. M. Hwang. 6. 花枝; 7. 叶上面示被毛; 8. 叶下面示被毛; 9. 花去花瓣示花萼和雌蕊; 10. 外轮雄蕊; 11. 内轮雄蕊。12—17. 钝裂溲疏 *D. obtusilobata* S. M. Hwang. 12. 花枝; 13. 叶上面示被毛; 14. 叶下面示被毛; 15. 花去花瓣示花萼和雌蕊; 16. 外轮雄蕊; 17. 内轮雄蕊。(余汉平绘)