

毛具中央长辐线，侧脉每边 4—5 条；叶柄长 3—5 毫米，被星状毛。聚伞花序常密聚，半圆形，长 4.5—5 厘米，直径 3—6 厘米，有花 9—18 朵；花蕾长圆形；花冠直径 1.8—2 厘米；花梗长 1—1.5 厘米；萼筒杯状，高与直径均约 3 毫米，密被 12—18 辐线星状毛，裂片革质，卵状披针形，约与萼筒近等长，紫红色，具 1 脉，被毛较稀疏；花瓣粉红色，倒卵状椭圆形，长 8—10 毫米，宽 4—6 毫米，外面疏被星状毛，花蕾时内向镊合状排列；外轮雄蕊长约 6 毫米，花丝先端 2 齿，齿长超过花药，花药长圆形，具短柄，内轮雄蕊较短，花丝先端急尖或不等 2 浅裂，花药从花丝内侧近中部伸出；花柱 3，与雄蕊近等长。蒴果近球形，直径约 5 毫米，褐色，具宿存萼裂片外弯。花期 6 月。

产四川（雷波）。生于海拔约 2000 米混交林中。模式标本采自雷波。

本种的花和叶形与 *D. longifolia* Franch. 近似，但其叶下面常灰白色，密被 12—16 辐线星状毛，与其区别明显，故宜作为种的等级。

41. 中甸溲疏

Deutzia zhongdianensis S. M. Hwang in Acta Bot. Aus. Sin. **8**: 18. fig. 11. 1992.

灌木，高约 1 米；老枝紫褐色，无毛，表皮成薄片状脱离；花枝长 12—22 厘米，具叶 6 片，疏被星状毛。叶革质，卵形，长 5—10 厘米，宽 2—5 厘米，先端渐尖，基部圆形，稀阔楔形，边缘具细尖锯齿，上面疏被 4—5 辐线星状毛，下面黄褐色，密被 8—10（—12）辐线星状毛，叶脉上常具中央长辐线，侧脉每边 4—5 条；叶柄长 5—10 毫米，被星状毛。聚伞花序有时呈圆锥状，顶生，长 6—7 厘米，直径 5—6 厘米，多花；花蕾椭圆形；花冠直径 15—18 毫米；花梗长 2—4 毫米；萼筒杯状，高约 3 毫米，直径约 4 毫米，密被灰色 10—12 辐线星状毛，裂片长圆状披针形，长 4—5 毫米，较萼筒稍长；花瓣白色，倒卵形或椭圆形，长 7—8 毫米，宽 4—5 毫米，先端钝，边缘皱波状，外面疏被星状毛，内面无毛，花蕾时内向镊合状排列；外轮雄蕊长 6—7 毫米，花丝先端 2 齿，齿钝，约与花药近等长，花药长圆形，具短柄，内轮雄蕊长 4—5 毫米，花丝先端钝或 2—3 浅裂，花药从花丝内侧近中部伸出，花柱 3，较雄蕊短。蒴果未见。

产云南（中甸）。生于海拔 2100—3500 米灌丛中。模式标本采自中甸。

42. 南川溲疏

Deutzia nanchuanensis W. T. Wang in Bull. Bot. Res. **3** (2): fig. 85. 1983. —
D. jinyangensis P. He et L. C. Hu in Phytologia **69** (5): 329. 1990.

灌木，高 1.5—2.5 米；老枝灰褐色，无毛，表皮常片状脱落；花枝长 5—8 厘米，具 4—6 叶，暗紫色，被星状毛。叶近革质或厚纸质，长圆状披针形或披针形，长 5—7（—13）厘米，宽 1.6—3（—4.5）厘米，先端急尖或急渐尖，基部楔形或阔楔形，边缘具细密锯齿，齿端角质，有时紫红色，上面绿色，疏被 4—6 辐线星状毛，下面黄褐色，被 7—9（—13）辐线星状毛，毛紧贴叶面，常与叶表皮颜色相同，毛被不连续覆盖，叶脉上常具中央长辐线，侧脉每边 5—6 条；叶柄长 2.5—5（—10）毫米。聚伞花序长 3—8 厘米，