

内轮雄蕊稍短，花丝先端常2—3浅裂、圆或急尖，花药从花丝内侧近中部伸出；花柱3—4，与雄蕊近等长。蒴果半球形，直径约4.5毫米，褐色，疏被8—10辐线星状毛，宿存萼裂片外弯。花期4—6月，果期6—10月。

产四川、云南和西藏东南部。生于海拔2600—3500米灌丛中。缅甸和印度亦产。模式标本的种子采自云南洱源附近，栽培于法国巴黎植物园。

44. 大萼溲疏 宾川溲疏 (中国高等植物图鉴补编)

Deutzia calycosa Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 149. 1912; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 935. 1912; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 254. 1915—1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 65. 1924; Engl. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. Aufl. 2, 18a: 198. 1930; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 441. 1931; Zaikonn. Дейции-Декорат. Куст. (Моногр. Deutzia) 79. fig. 13 (2). 20 (5). 1966; 中国高等植物图鉴补编 2, 2: 53. 1985. — *D. calycosa* Rehd. var. *brachytricha* Hand.-Mazz. 1. c. 7 (2): 441. 1931. — *D. Calycosa* Rehd. var. *longisepala* Zaikonn. Дейции-Декорат. Куст. (Моногр. Deutzia) 81. fig. 20 (5). 1966. — *D. glomeruliflora* auct. non Franch.; Rehd. op. cit. 1: 10. 1911. p. p. — *D. discolor* auct. non Hemsl.; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 7: 291. 1912—1913. — *D. longifolia* auct. non Franch.; Hand.-Mazz. op. cit. 440. 1931. p. p.

44a. 大萼溲疏 (原变种) 图版 23: 8—13

var. *calycosa*

灌木，高约2米；老枝灰褐色，无毛，表皮常片状脱落；花枝长5—7.5厘米，具2—4叶，紫褐色，被星状毛。叶纸质或厚纸质，卵状长圆形，花枝上的叶阔卵形或卵状披针形长5—8（—10）厘米，宽1.2—3.5（—4.5）厘米，先端渐尖，基部圆形或阔楔形，边缘具疏离锯齿，齿常大小相间，上面绿色，疏被4—6辐线星状毛，下面灰绿色或灰白色，疏被7—10（—12）辐线星状毛，两面星状毛有时均具中央长辐线，侧脉每边5—6条；叶柄长3—5毫米，疏被星状毛。伞房状聚伞花序紧缩或开展，长3—4毫米，宽4—5厘米，有花9—12朵；花序梗细长，柔细或有时无梗；花蕾长圆形；花冠直径1.5—2.5厘米；花梗长5—15（—20）毫米；萼筒杯状，高3—3.5毫米，直径3.5—4毫米，密被8—10辐线星状毛，具中央长辐线或无，裂片膜质，披针形或长圆状披针形，长5—8毫米，宽约1.5毫米，被毛较萼筒稀疏；花瓣白色或稍粉红色，卵状长圆形，长10—15毫米，宽4—8毫米，外面被星状毛，花蕾时内向镊合状排列；外轮雄蕊长6—8毫米，花丝先端钝齿，齿扩展，长约与具柄花药相等，内轮雄蕊较短，先端渐尖，浅2—3裂或钝圆，花药柄从花丝内侧中部以上伸出；花柱3（—4），约与雄蕊等长。蒴果半球形，直径约5毫米，褐色，具宿存萼裂片外弯。花期3—4月，果期7—8月。

产四川西南部和云南西部。生于海拔2000—3000米林下或山坡灌丛中。模式标本采