

立或内弯；果梗长 1—1.5 厘米。 果期 6 月。

产四川（巫溪）。生于海拔 600 米石灰岩石。

49. **褐毛溲疏**（中国植物图谱） 软毛溲疏（秦岭植物志）

Deutzia pilosa Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 8. 1911; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 932. 1912; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 66. 1924; Hu in Hu et Chun Icon. Pl. Sin. 5: 23. Pl. 223. 1937; Zaikonn. Дейции-Декорат. Куст. (Моногр. Deutzia) 72. 1966; 中国高等植物图鉴 2: 99. 图 1972. 1971; 秦岭植物志 1 (2): 460. 1974.

49a. **褐毛溲疏**（原变种） 图版 26: 1—6

var. *pilosa*

灌木，高 1—1.8 米；老枝褐色或灰色，表皮纵裂，有时脱落，无毛；花枝长 6—8 厘米，具 4—6 叶，褐色或紫红色，被具中央长辐线星状毛。叶纸质，卵形、卵状披针形或长圆状卵形，长 3—9.5 厘米，宽 1.5—5 厘米，先端渐尖或尾尖，尖头长 1—2 厘米，有时稍弯，基部圆形或阔楔形，边缘具细锯齿，上面被 4—5（—6）辐线星状毛，下面被 6—7（—8）辐线星状毛，均具中央长辐线，侧脉每边 3—4 条，网脉稍稀疏，下面隆起明显；叶柄长 1—3 厘米。伞房状聚伞花序，长 3—5 厘米，直径 4—6 厘米，有花 3—12 朵；花蕾长圆形；花冠直径 1.5—1.8 厘米；花梗长 3—10 毫米；萼筒杯状，高约 3 毫米，直径约 3.5 毫米，密被 8—12 辐线星状毛，有时具中央长辐线，裂片卵形或卵状披针形，先端急尖，长不及或稍超过萼筒的一半；花瓣白色，卵状长圆形，长 8—10 毫米，外面被星状毛，花蕾时内向镊合状排列；外轮雄蕊长 4—5 毫米，花丝先端 2 齿，齿扩展，长稍超过花药，花药球形，具短柄，内轮雄蕊长 3—4 毫米，花丝先端 2 浅裂或渐尖，花药从花丝内侧近中部伸出，花柱 3（—4），长约 2.5 毫米。蒴果近球形，直径约 5 毫米，具宿存萼裂片内弯。 花期 4—5 月，果期 6—8 月。

产甘肃（武都）、贵州、四川南部和云南（绥江）。生于海拔 400—2000 米山地林缘或石缝中。模式标本采自四川灌县。

49b. **峨眉溲疏**（变种）

var. *longiloba* P. He. et L. C. Hu in Phytologia 69 (5): 329. 1990.

本变种与原变种不同点在于萼裂片卵状披针形，长 3—4 毫米，先端渐尖。 花期 5 月。

产四川（峨眉）。生于海拔 1000 米灌丛中。模式标本采自峨眉。

50. **狭叶溲疏**（中国高等植物图鉴） 柳叶溲疏（中国高等植物图鉴补编） 图版 26: 7—11

Deutzia esquirolii (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 14: 202. 1933 et 17: 333. 1936; Zaikonn. Дейции-Декорат. Куст. (Моногр. Deutzia) 66. fig. 9 (16). 14 (6). 19.