

蕊稍短，花丝先端钝、啮蚀状或稍 2 裂，花药从花丝内侧近中部或顶端稍下伸出；花柱 3，长 2—2.5 毫米，与雄蕊近等长。蒴果未见。

产贵州镇宁。生于河谷边。

52. **四川溲疏** (中国树木分类学) 夏季石藤 (中国植物名录)，白茂树 (湖北会丰)，川溲疏 (经济植物手册)

Deutzia setchuenensis Franch. in Morot, Journ. de Bot. **10**: 282. 1896; Schneid. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **13**: 181. 1904 et Ill. Handb. Laubh. **2**: 932. 1912; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 474. 1905; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 18. 1911 et Man. Cult. Trees & Shrubs 285. 1927; Limpr. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**: 402. 1922; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 66. 1924; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7** (2): 439. 1931; 陈嵘, 中国树木分类学 377. 1937; 胡先骕, 经济植物手册, 上册; 493. 1955; Krüssmann, Handb. Laubgeh. **1, 6**: 391. 1960; Zaikonn. Дейщин-Декорат. Куст. (Моногр. Deutzia) 70. fig. 9 (10). 14 (7). 1966; 中国高等植物图鉴 **2**: 98. 图 1926. 1972; 湖北植物志 **2**: 104. 图 836. 1979; S. M. Hwang in Acta Bot. Aus. Sin. **8**: 25. 1922. — *D. bodinieri* Rehd. op. cit. **1**: 147. 1912; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 386. 1914—1915; Schneid. l. c. **2**: 932. 1912; Chung op. cit. **1**: 65. 1924; Zaikonn. op. cit. 66. fig. 16. 1966. — *D. cyanocalyx* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **10**: 438. 1910—1912. — *D. pilosa* Rehd. var. *ochrophloeos* Rehd. op. cit. **1**: 146. 1912.

52a. **四川溲疏** (原变种) 图版 26: 12—16

var. **setchuenensis**

灌木，高约 2 米；老枝灰色或灰褐色，表皮常片状脱落，无毛；花枝长 8—12 (—20) 厘米，具 4—6 叶，褐色或黄褐色，疏被紧贴星状毛。叶纸质或膜质，卵形、卵状长圆形或卵状披针形，长 2—8 厘米，宽 1—5 厘米，先端渐尖或尾状，基部圆形或阔楔形，边缘具细锯齿，上面深绿色，被 3—5 (—6) 辐线星状毛，沿叶脉稀具中央长辐线，下面干后黄绿色，被 4—7 (—8) 辐线星状毛，侧脉每边 3—4 条，下面明显隆起，网脉不明显隆起；叶柄长 3—5 毫米，被星状毛。伞房状聚伞花序长 1.5—4 厘米，直径 2—5 厘米，有花 6—20 朵；花序梗柔弱，被星状毛；花蕾长圆形或卵状长圆形；花冠直径 1.5—1.8 厘米；花梗长 3—10 毫米；花瓣白色，卵状长圆形，长 5—8 厘米，宽 2—3 厘米；萼筒杯状，长宽均约 3 毫米，密被 10—12 辐线星状毛，裂片阔三角形，长约 1.5 毫米，宽 2—3 毫米，先端急尖，外面密被星状毛；花蕾时内向镊合状排列；外轮雄蕊长 5—6 毫米，花丝先端 2 齿，齿长圆形，扩展，约与花药等长或较长，花药具短柄，从花丝裂齿间伸出，内轮雄蕊较短，花丝先端 2 浅裂，花药从花丝内侧近中部伸出；花柱 3，长约 3 毫米。蒴果球形，直径 4—5 毫米，宿存萼裂片内弯。花期 4—7 月，果期 6—9 月。