

产辽宁、吉林和黑龙江。生于海拔150—900米杂木林中。俄罗斯东南部和朝鲜亦产；欧、美各国常有栽培。模式标本采自阿穆尔河附近。

3b. 宽瓣山梅花 (变种)

var. *latipetalus* S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **36**: 351. 1955.

本变种与原变种不同点在于叶卵形，长达11厘米，宽达6厘米，基部圆形或钝，先端渐尖，边缘具细锯齿；花瓣近圆形，长约10毫米，宽约9.5毫米。花期6月。

产东北。模式标本采自东北。

4. 东北山梅花 (东北木本植物图志) 辽东山梅花 (中国树木分类学)，石氏山梅花 (经济植物手册)

Philadelphus schrenkii Rupr. in Bull. Phys. Math. Acad. Sci. St. Pétersb. **15**: 365. 1857 et in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Petersb. **2**: 542. 1858; Koehne, Deutsch. Dendr. **182**. 1893 et Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **1904** (13); 84. 1904; Kom. in Acta Hort. Petrop. **22**: 429. 1903; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**: 372. fig. 237 w—w². 1905; Smith in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 500. 1905; Nakai, Fl. Sylv. Kor. **15**: 53. pl. 12. 1962; Minami, List. Pl. Manch. Mong. **183**. 1926; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 64. 1924; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs **276**. 1927 et ed. 2, 271. 1940 et Bibl. Cult. Trees & Shrubs **193**. 1949; 陈嵘, 中国树木分类学, 374. 1937; Bean, Trees & Shrubs ed. 7, **2**: 419. 1950 et in Chitt, Dict. Gard. **3**: 1546. 1951; S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **36**: 357. 1955; 胡先骕, 经济植物手册, 上册, 487. 1955; 东北木本植物图志 **266**. 图版 95. 图 174. 1955; 中国高等植物图鉴 **2**: 96. 图 1921. 1972.

4a. 东北山梅花 (原变种) 图版 28: 4—6

var. *schrenkii*

灌木，高2—4米；二年生小枝灰棕色或灰色，表皮开裂后脱落，无毛，当年生小枝暗褐色，被长柔毛。叶卵形或椭圆状卵形，生于无花枝上叶较大，长7—13厘米，宽4—7厘米，花枝上叶较小，长2.5—8厘米，宽1.5—4厘米，先端渐尖，基部楔形或阔楔形，边全缘或具锯齿，上面无毛，下面沿叶脉被长柔毛；叶脉离基出3—5条；叶柄长3—10毫米，疏被长柔毛。总状花序有花5—7朵；花序轴长2—5厘米，黄绿色，疏被微柔毛；花梗长6—12毫米，疏被毛；花萼黄绿色，萼筒外面疏被短柔毛，裂片卵形，长4—7毫米，顶端急尖，外面无毛，干后脉纹明显；花冠直径2.5—3.5（—4）厘米，花瓣白色，倒卵或长圆状倒卵形，长1—1.5厘米，宽1—1.2厘米，无毛；雄蕊25—30，最长达10毫米；花盘无毛；花柱从先端分裂至中部以下，被长硬毛，柱头槌形，稀棒形，长1—1.5毫米，常较花药小。蒴果椭圆形，长8—9.5毫米，直径3.5—4.5毫米；种子长2—2.5毫米，具短尾。花期6—7月，果期8—9月。

产辽宁、吉林和黑龙江。生于海拔100—1500米杂木林中。朝鲜和俄罗斯东南部亦