

9. 山梅花 (植物名实图考) 白毛山梅花 (秦岭植物志)

Philadelphus incanus Koehne in Gartenfl. **45**: 562. 1896. (exclud. specim. Henry 8823) et in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **1904** (13): 84. 1904 et in Sargent, Pl. Wils. **1**: 5. 1911 et **1**: 145. 1912; Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 371. 1900; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**: 370. 1905; Smith in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 500. 1905; Wils. Arn. Arb. Exp. China 1910—1911. Pl. 27. 1912; Bean, Trees & Shrubs **2**: 135. 1914 et ed. 7, **2**: 414. 1950. et in Chitt., Dict. Gard. **3**: 1546. 1951; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 64. 1924; 1950; Hers in Journ. N. China Branch Roy. As. Soc. **53**: 113. 1922 et List. Ess. Lign. Honan 20. 1922; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5**: 153. 1924 et Man. Cult. Trees & Shrubs 274. 1927 et ed. 2, 268. 1940 et Bibl. Cult. Trees & Shrubs 192. 1949; S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **36**: 338. 1955; 胡先骕, 经济植物手册, 上册, 489. 1955; 中国高等植物图鉴 **2**: 95. 图 1919. 1972; 秦岭植物志 **1** (2): 457. 1972; 湖北植物志 **2**: 98. 图 824. 1979. — *P. coronarius* var. *tomentosus* auct. non Hook. f. & Thoms.; Forb. & Hemsl. in Jorun. Linn. Soc. Bot. **23**: 277. 1887.

9a. 山梅花 (原变种) 图版 30: 1—5

var. **incanus**

灌木, 高 1.5—3.5 米; 二年生小枝灰褐色, 表皮呈片状脱落, 当年生小枝浅褐色或紫红色, 被微柔毛或有时无毛。叶卵形或阔卵形, 长 6—12.5 厘米, 宽 8—10 厘米, 先端急尖, 基部圆形, 花枝上叶较小, 卵形、椭圆形至卵状披针形, 长 4—8.5 厘米, 宽 3.5—6 厘米, 先端渐尖, 基部阔楔形或近圆形, 边缘具疏锯齿, 上面被刚毛, 下面密被白色长粗毛; 叶脉离基出 3—5 条; 叶柄长 5—10 毫米。总状花序有花 5—7 (—11) 朵, 下部的分枝有时具叶; 花序轴长 5—7 厘米, 疏被长柔毛或无毛; 花梗长 5—10 毫米, 上部密被白色长柔毛; 花萼外面密被紧贴糙伏毛; 萼筒钟形, 裂片卵形, 长约 5 毫米, 宽约 3.5 毫米, 先端骤渐尖; 花冠盘状, 直径 2.5—3 厘米, 花瓣白色, 卵形或近圆形, 基部急收缩, 长 13—15 毫米, 宽 8—13 毫米; 雄蕊 30—35, 最长的长达 10 毫米; 花盘无毛; 花柱长约 5 毫米, 无毛, 近先端稍分裂, 柱头棒形, 长约 1.5 毫米, 较花药小。蒴果倒卵形, 长 7—9 毫米, 直径 4—7 毫米; 种子长 1.5—2.5 毫米, 具短尾。花期 5—6 月, 果期 7—8 月。

产山西、陕西、甘肃、河南、湖北、安徽和四川。生于海拔 1200—1700 米林缘灌丛中。欧美各地的一些植物园有引种栽培。模式标本采自湖北宜昌。

本种花多, 花期较长, 常作庭园观赏植物。

山梅花分变种检索表

1. 总状花序疏离排列, 有花 7—11 朵, 花序轴长 4—7 厘米, 花梗长 5—10 毫米。