

常绿攀援灌木，长达16米；嫩枝、叶下面和花序均密被淡褐色或锈色星状柔毛，星状毛常为3—6辐线；老枝圆柱形，近无毛，灰褐色。叶革质，长圆形或倒卵状长圆形，稀倒披针形，长5—10（—18）厘米，宽2.5—5（—8）厘米，先端急尖或阔急尖，尖头突出，基部圆形或近叶柄处稍凹入呈心形，稀小枝最上两叶宽楔形，边近全缘或近顶端具三角形粗齿或不规则波状，背卷，嫩叶上面疏被星状毛，以后脱落，干时灰绿色或黄绿色，下面密被毛，以叶脉上被毛较密，侧脉每边8—13条；叶柄长1.2—1.5厘米。伞房状圆锥花序顶生，长和宽均10—25厘米；苞片线形或钻形，长5—10毫米，宽1—2毫米，被星状毛；花白色；花梗长约2毫米；萼筒杯状，高约2毫米，裂片三角形，疏被星状毛；花瓣卵形，长约2毫米，早落，无毛；雄蕊8—10，花丝长5—6毫米；花柱长约1.5毫米，柱头圆锥状，4—6裂，被毛。蒴果陀螺状，平顶，直径约4毫米，被稀疏星状毛，具宿存花柱和柱头，具棱，暗褐色；种子细小，连翅长约2毫米，棕色。花期3—8月，果期9—12月。

产江西、福建、湖南、广东和广西。生于海拔300—700米林谷中。模式标本采自广东英德。

6. 常山属* *Dichroa* Lour.

Lour. Fl. Cochinch. 307. 1790; Benth. Fl. Hongk. 128. 1862; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 641. 1865; Maxim. in Mem. Acad. Sci. St. Petersb. ser. 7, 10 (16); 2. 1867; Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Aufl. 2, 18a: 209. 1930. — *Cyanitis* Reinw. in Bl. Cat. Buitenz. 68: 921. 1823. — *Adamia* Wall. Tent. Fl. Nep. 46. t. 36. 1824; DC. Prodr. 4: 16. 1830. — *Cianitis* Reinw. in Syll. Pl. Nov. Ratisb. 2: 10. 1828.

落叶灌木。叶对生，稀上部互生。花两性，一型，无不孕花，排成伞房状圆锥花序或聚伞花序；萼筒倒圆锥形，贴生于子房上，裂片5（—6）；花瓣5（—6），彼此分离，稍肉质，顶端常具内向的短角尖，花蕾时镊合状排列；雄蕊4—5或10—（—20），花丝线形或钻形，花药卵形或椭圆形，2室，药室纵裂，花丝在花蕾时常有半数弯曲而使花药倒悬；子房近下位或半下位，上部一室，下部有不连接或近连接的隔膜4—6，胚珠多数，生于向内伸展的侧膜胎座上；花柱（2—）3—6，分离或仅基部合生，开展，柱头长圆形或近球形。浆果，略干燥，不开裂；种子多数，细小，无翅，具网纹。

本属模式种：常山 *D. febrifuga* Lour.

* 异名：黄常山属。

本属约有 12 种, 广泛分布于亚洲东南部的热带和亚热带地区, 仅少部分分布至太平洋岛屿。我国产 6 种, 分布于西南部至东部。

常山属分种检索表

1. 子房近下位或 3/4 下位, 花蕾倒卵形, 花柱 4—6, 柱头长圆形, 花丝线形 (系 1. 常山系 Ser. *Dichroa*)。
 2. 小枝、叶柄和叶脉均被皱卷短柔毛或无毛; 伞房状圆锥花序 1. 常山 *D. febrifuga* Lour.
 2. 小枝、叶柄和叶脉均被两种毛, 一为皱卷短柔毛, 另一为长粗毛。
 3. 花萼裂片钝三角形, 长约 1 毫米, 无毛, 花瓣无毛 3. 大明常山 *D. daimingshanensis* Y. C. Wu
 3. 花萼裂片披针形, 长 2—6 毫米, 被长粗毛, 花瓣被毛或无毛。
 4. 花瓣两面均被长硬毛或内面无毛, 花药无毛; 叶先端急尖 3. 罗蒙常山 *D. yaoshanensis* Y. C. Wu
 4. 花瓣无毛或仅外面疏被长硬毛, 花药被长丝毛或无毛; 叶先端渐尖或尾尖 4. 硬毛常山 *D. hirsuta* Gagnep.
1. 子房半下位, 花蕾近球形, 花柱 (2—)3(—4), 柱头近球形, 花丝钻形 (系 2. 海南常山系 Ser. *Mollissimae* S. M. Hwang)。
 5. 叶上面无毛, 下面密被长柔毛; 伞房状聚伞花序长 5—7 厘米 5. 海南常山 *D. mollissima* Merr.
 5. 叶两面均被皱卷短柔毛, 上面兼具疏散长粗毛; 伞房状圆锥花序长 10—22 厘米 6. 云南常山 *D. yunnanensis* S. M. Hwang

系 1. 常山系 Ser. *Dichroa* S. M. Hwang in *Acta Phytotax. Sin.* **25** (1): 384—389. 1987.

子房近下位或半下位; 花蕾倒卵形; 花柱 4 (—5—6), 柱头长圆形; 花丝线形。

本系模式种: 常山 *D. febrifuga* Lour.

本系有下列 3 种。

1. 常山 (证类本草) 恒山 (敦煌新修残卷), 蜀漆 (苗的药材名), 土常山, 黄常山、白常山

Dichroa febrifuga Lour. Fl. Cochinch. 301. 1970 et Willd. 369. 1793; Benth. Fl. Hongk. 128. 1862; Maxim. in Mem. Acad. Sci. St. Pétersb. ser. 7. **10** (16): 2. 1867; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 406. 1879; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine **2**: 688. 1920; Ridley, Fl. Malay Pennis. **1**: 681. 1922; Chung in Mem. Sci. Soc. China **1**: 69. 1924; Engl. in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. Aufl. 2, **18a**: 209. fig. 117. A—G. 118. 1930; Hand. -Mazz. in Beih. Bot. Contralbl. **48**: