

花期 8 月，果期 10 月。

产台湾和浙江（昌化）。生于中海拔山地林下阴湿处。模式标本采自台湾。

3. 密叶草绣球（华南植物研究所集刊） 图版 38: 1—8

Cardiandra densifolia Wei in 华南植物研究所集刊 10: 9. 1995.

亚灌木，高约 30 厘米；茎暗褐色，被疏短柔毛。叶通常 6—8 片聚生于茎的下部或近基部，椭圆形，较小，长 5—7 厘米，宽 2—3.5 厘米，先端急尖或短渐尖，具短尖头，基部稍下延，狭楔形，边缘具短小锯齿，纸质，干后上面暗褐色，被短疏糙伏毛，下面灰褐色，被稀疏短柔毛或几乎无毛；侧脉 6—7 对，弯拱，两面平坦，小脉网状，下面微凹；叶柄长 5—15 毫米，上面具凹槽，被疏短柔毛。伞房状聚伞花序顶生，直径约 9 厘米，顶端平坦，被紧贴短柔毛；苞片线形，长 2—8 毫米；不育花少数，萼片 2，阔卵形，不等大，较大的长约 2 厘米，宽约 1.8 厘米，较小的长约 1.5 厘米，宽约 1.4 厘米，先端具骤尖头，基部深心形，具脉纹，上面无毛，下面近基部被微柔毛；孕性花多数；萼筒近钟状，长 1.5—2 毫米，萼齿卵形或卵状三角形，长 0.7—1 毫米；花瓣阔长圆形或倒卵形，长 3—3.5 毫米，宽 2—2.5 毫米，先端圆，基部稍狭，近截平；雄蕊 28—30 枚，稍不等长，花药倒心形，顶端截平，药室 2，纵裂，药隔宽，倒三角形，扁平；子房近下位，花柱 2—4，长约 1 毫米，扁平。蒴果未见。 花期 9 月。

产台湾。生境和海拔高度不明。模式标本采自台北。

8. 蛛网萼属* *Platycrater* Sieb. et Zucc.

Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 62. 1835; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1:

642. 1865; Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 106. 1954; Hutchins.

Gen. Flow. Pl. 2: 17. 1968.

落叶灌木；茎直立、平卧或匍匐状；冬芽有干膜质、渐尖的鳞片 2—3 对；小枝圆柱形，树皮薄，脱落。叶薄纸质，对生或交互对生，披针形或椭圆形，边缘有锯齿。伞房状聚伞花序有少数分枝；苞片线形，宿存；花少数，二型；不育花位于花序的外侧，常具退化的花瓣和雌蕊；萼片 3—4，合生，轮廓三角形或四方形，先端 3—4 裂或仅有 3—4 个浅的缺刻，半透明，具密集柔弱的网脉；孕性花位于花序内侧；萼筒与子房贴生，萼齿 4—5，三角状卵形或狭三角形，先端尖，宿存；花瓣 4，卵圆形，肉质，离生，镊合状排列，早落；雄蕊无限，多轮，着生于环状花盘下侧，花丝丝状，基部稍合生，花药阔长圆形，基着；子房下位，2 室，胚珠多数，花柱 2，直立或扩展，柱头乳头状或向内倾斜，稍下延。蒴果倒圆锥形，2 室，成熟时于顶端花柱基部之间孔裂；种子多数，小，

* 异名：梅花甜茶属。



图版 38 1—8. 密叶草绣球 *Cardiantha densifolia* Wei: 1. 植株; 2. 叶上面一部分; 3. 叶下面一部分; 4. 不育花萼片; 5. 孕性花; 6. 花瓣; 7. 雄蕊; 8. 花除去花瓣和雄蕊, 示花萼和雌蕊。9—10. 草绣球 *C. moellendorffii* (Hance) Migo: 9. 花枝; 10. 花除去花瓣和雄蕊, 示花萼和雌蕊。(邓盈丰绘)