

攀援于乔木或石壁上。

2. 大果钻地风 (植物分类学报) 图版 40: 1—4

*Schizophragma megalocarpum* Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 164. 1954.

木质藤本或藤状灌木; 小枝灰褐色, 近无毛, 具纵条纹。叶纸质, 阔卵形, 长 11—15 厘米, 宽 8—11 厘米, 先端急尖或渐尖, 基部截平或微心形, 边缘略反卷, 全缘或上部有稀疏的仅具硬尖头的小齿, 干后上面褐色, 无毛, 下面黄褐色, 沿脉被短柔毛, 中脉两侧和脉腋间的毛常较密集, 侧脉 7—8 对, 弯拱, 下面凸起, 常有 1—2 条、弯拱与侧脉近等粗的 2 级分枝, 三级脉不规则横出, 小脉网状, 密集, 两面微凸; 叶柄长 2.5—9 厘米, 近无毛。伞房状聚伞花序初时密被褐色、紧贴短柔毛, 后总轴及其分枝下部渐变无毛; 不育花萼片卵状披针形, 长 2.5—6 厘米, 宽 1.5—4 厘米; 孕性花萼筒倒圆锥形, 长约 3 毫米, 具棱, 基部狭长, 萼齿卵状三角形, 长约 0.5 毫米; 花瓣长圆形, 长 2.5—3 毫米, 宽 1—1.5 毫米, 先端略尖, 风帽状; 雄蕊近等长, 盛开时长达 5 毫米, 花药长圆形, 长约 0.8 毫米; 子房近下位, 花柱和柱头长约 1 毫米。蒴果倒圆锥形, 全长 8—12 毫米, 宽 3—5 毫米, 基部尖, 狭楔形, 顶端突出部分阔圆锥形, 长 1.5—2 毫米; 种子连翅轮廓纺锤形, 略扁, 长 5—7 毫米, 先端的翅略宽, 长 2—3 毫米。花期 7 月, 果期 10—11 月。

产四川 (宝兴、天全)。生于山谷林中, 海拔 600 米以上。模式标本采自四川宝兴。

3. 临桂钻地风 (广西植物) 畴芬钻地风 (植物分类学报)

*Schizophragma choufenianum* Chun in Acta Phytotax. Sin 3 (2): 169. 1954. p. p.


木质藤本或藤状灌木; 小枝褐色, 光滑, 老后表皮呈薄片状剥落。叶纸质, 椭圆形, 长 14—19 厘米, 宽 8—12 厘米, 先端渐尖, 基部阔楔形, 边全缘或上部有稀疏细齿, 干后上面暗褐色, 无毛, 下面粉绿色, 干后灰黄褐色, 初时沿脉被短柔毛, 后变无毛; 侧脉 7—8 对, 弯拱, 有时具 1—2 条与侧脉近等粗的二级分枝, 下面凸起, 三级脉不规则横出, 小脉网状, 密集, 两面稍明显; 叶柄较长, 长 8—11 厘米, 上面具凹槽。伞房状聚伞花序具稠密的花, 分枝扩展, 结果时几乎无毛; 不育花萼片披针形, 结果时长 3—5 厘米, 宽 1—2 厘米, 单生或兼有孪生; 孕性花未见。蒴果较小, 稠密, 倒圆锥形, 全长 1—5 毫米, 宽 3—4 毫米, 顶端截平, 宿存萼齿三角形, 长约 0.5 毫米, 先端尖, 花柱和柱头长约 1 毫米; 种子褐色, 连翅轮廓纺锤状, 长 2—2.5 毫米, 宽约 0.5 毫米, 稍扁, 先端的翅稍宽, 长 0.5—1 毫米。果期 11 月。

产广西临桂。生于山谷石间潮湿处, 斜倚或平卧, 海拔约 600 米。

本种模式标本是梁畴芬 1953 年 11 月 14 日于广西临桂县潮田区七分山采到的, 编号为 30471A, 但在原描述中, 模式标本则被误写成 30471B。

4. 柔毛钻地风 (植物分类学报) 长叶柔毛钻地风、红毛钻地风 (植物分类学报)

图版 41: 3—5



图版 40 1—4. 大果钻地风 *Schizophragma megalocarpum* Chun; 1. 果枝; 2. 叶上面一部分; 3. 叶下面一部分, 示脉上的毛; 4. 蒴果。5—9. 维西钻地风 *S. crassum* Hand.-Mazz. var. *hsिताoianum* (Chun) Wei; 5. 果枝; 6. 叶上面一部分; 7. 叶下面一部分, 示毛; 8. 蒴果; 9. 种子。(邓盈丰绘)