

米，被毛，上面具凹槽。伞房状聚伞花序顶生，序轴、分枝及花梗密被紧贴、褐色短柔毛；不育花萼片单生，长圆形或披针形，长2—4厘米，宽9—25毫米，两端钝或略尖，结果时黄色；孕性花未见。蒴果黑褐色，倒圆锥形，全长5—7毫米，宽2.5—3毫米；宿存萼齿三角形，长约1毫米，先端尖，宿存花柱极短，柱头头状，长约0.5毫米；种子褐色，连翅轮廓纺锤形，稍扁，长2.5—3毫米，宽0.5—0.7毫米，先端的翅长约1毫米，较宽。花期6月，果期9—10月。

产福建、台湾。生于山坡密林中，海拔1500—2500米。模式标本采自台湾台北大屯山。

8. 椭圆钻地风 (广西植物) 图版 42: 1—5

Schizophragma ellipsophyllum Wei in 广西植物 14 (3): 202, 1994.

木质藤本或藤状灌木；小枝圆柱形，褐红色，光滑无毛，具纵条纹。叶厚纸质，椭圆形，长7—12厘米，宽3—7厘米，先端急尖或短渐尖，基部楔形或钝，边全缘而略反卷，上面深绿色，无毛，下面灰绿色，除脉腋间有少许髯毛外，无毛，但有多数密集的颗粒状腺体（在高倍放大镜下可见）；中脉在上面常凹入，下面隆起，侧脉8—10对，弯拱，通常无二级分枝，上面平坦，下面凸起，小脉稀疏网状，两面明显；叶柄长1.5—6.5厘米，无毛，上面具凹槽。伞房状聚伞花序顶生，分枝及花梗初时密被褐色短柔毛，后渐变近无毛；不育花萼单生，长圆形或披针形，长2—4.5厘米，宽9—19毫米，两端钝或略尖，黄白色；孕性花萼筒倒圆锥形，长约1毫米，萼齿三角形，长约0.5毫米，与萼筒疏被短柔毛；花瓣长圆形或卵形，长2—2.5毫米，宽1—1.3毫米，先端略尖，淡黄白色；雄蕊10枚，近等长，盛开时长8—10毫米，花药近圆形，长约0.5毫米；子房近下位，花柱长约1毫米，柱头小，头状。蒴果倒圆锥形，小，连花柱长4.5—5.5毫米，宽约2.5毫米，具10棱，顶端突出部分短圆锥形，长约0.5毫米；种子褐色，连翅轮廓纺锤形，略扁，长2—2.8毫米，两端的翅长0.5—1毫米，基部的翅略短，钻状，淡黄白色。花期7月，果期10月。

产四川、贵州、云南。生于沟边石旁灌丛中或山坡疏林下或山脊上，海拔1400—2100米。模式标本采自四川南川。

9. 厚叶钻地风 (植物分类学报)

Schizophragma crassum Hand. -Mazz. in Anz. Adad. Wien. Math. -Nat. 59: 247. 1922 et Symb. Sin. 7: 446. 1931; Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 172. 1954.

9a. 厚叶钻地风 (原变种)

var. *crassum*

木质攀援藤本；茎粗壮，直径达3厘米，小枝带紫色，幼时密被褐色粗硬毛，后渐变无毛。叶厚纸质，阔卵形或近圆形，长6.5—16厘米，宽度稍小于长度，先端急尖或有时具短尖头，基部圆形或阔心形，边缘有具短芒头的细齿，上面暗绿色，无毛，仅于