

达 14 厘米，顶端微拱或截平，分枝 3，不等粗，中间 1 条常较粗和长，密被淡黄褐色短柔毛；不育花萼片 3—4，阔卵形、三角状卵形或扁卵圆形，不等大，较大的长 1.3—2.3 厘米，宽 1.1—3 厘米，先端略尖或浑圆，全缘或具数小齿；孕性花深蓝色，萼筒杯状，长 0.7—1 毫米，宽 1.5—2 毫米，萼齿狭披针形或三角状卵形，长 0.5—1.5 毫米；花瓣狭椭圆形或倒卵形，长 2.5—4 毫米，宽 1—1.1 毫米，先端渐尖或钝，基部具长 0.5—1 毫米的爪；雄蕊 8—10 枚，近等长，长 1.5—2.5 毫米，较长的于花蕾时不内折，花药阔长圆形或近圆形，长 0.5—0.8 毫米；子房近半上位或半上位，花柱 3—4，花期长约 1 毫米，果期长 1.5—2 毫米，外弯，柱头增大，沿花柱内侧下延。蒴果近球形，连花柱长 3.5—4.5 毫米，宽 2.5—3.5 毫米，顶端突出部分长 1.2—2 毫米，约等于萼筒长度；种子淡褐色，倒卵形或椭圆形，长 0.5—0.6 毫米，无翅，具网状脉纹。花期 4—6 月，果期 9—10 月。

产四川、云南、贵州。生于山谷密林、山坡路旁疏林或林缘，海拔 1400—2400 米。模式标本采自四川宝兴。

5. 临桂绣球 (植物分类学报)

Hydrangea linkweiensis Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 125. 1954.

5a. 临桂绣球 (原变种)

var. *linkweiensis*

亚灌木至灌木，高达 3 米；一年生或二年生小枝暗紫褐色，初时被疏柔毛，后渐变无毛，第二年树皮呈薄片状剥落。叶薄纸质，狭披针形、披针形或有时卵状披针形，长 5—14 厘米，宽 1.7—4 厘米，两侧略微不对称，一侧常稍弯拱，先端渐尖成镰状或尾状尖头，基部阔楔形或钝，边缘有疏离小齿或锯齿，干后两面常呈暗红褐色或下面色稍淡，上面近无毛，下面面上被疏微毛，脉上尤其中脉上密被贴伏短柔毛；侧脉约 7 对，纤细，弯拱，下面明显，小脉稀疏网状，下面稍明显；叶柄细，长 4—10 毫米，基部略扩大，密被长柔毛。伞房状聚伞花序具 3—5 厘米长的总花梗，顶端截平，分枝 3，中间的常短小，两侧的较粗长，长 5—8 厘米，扩展，被贴伏短柔毛；不育花萼片 3，三角状卵形或阔卵形，不等大，结果时长 1.5—2.5 厘米，宽 1.5—2.7 厘米，先端略尖或钝，基部近截平，全缘，孕性花黄色，萼筒杯状，长约 1 毫米，宽约 1.5 毫米，被疏柔毛，萼齿卵状披针形，长 1.5—2.5 毫米；花瓣倒披针形或长倒卵形，长约 3.5 毫米，宽 1.2—1.7 毫米，先端略尖，具短细尖头，基部渐狭，具长约 0.5 毫米的短爪，具 1 中脉；雄蕊近等长，短于或稍长于花瓣，花药长圆形，长 1—1.2 毫米；子房半下位，花柱 3—4，结果时长 1.5—2 毫米，稍扩展，柱头增厚，沿花柱内侧下延。蒴果卵球形，连花柱长 5—6.5 毫米，宽 3—4 毫米，顶端突出部分长约 1.5 毫米，约等长于萼筒；种子褐色，长圆形、倒卵形或近圆形，长约 0.55 毫米，宽 0.3—0.5 毫米，无翅，具网状脉纹。花期 5—6 月，果期 8—9 月。