

产广西(兴安、临桂、金秀)。生于山谷或山坡密林、疏林或灌丛中,海拔770—1020米。模式标本采自临桂县。

5b. **利川绣球**(变种)(广西植物) 枝序伞形绣球(植物研究)

var. **subumbellata** (W. T. Wang) Wei in 广西植物 **14** (2): 108. 1994. — *H. angustipetala* Hayata var. *subumbellata* W. T. Wang in Bull. Bot. Res. **1** (1—2): 51. 1981 (quoad specim. Fu Guo-Xiun et Zhang Zhi-sung 1782; Li Hung-jiun 2606).

本变种与原变种主要不同之处在于,其叶较短小,下面无微柔毛,叶柄几乎无毛;蒴果椭圆状,较小,不连花柱长约3毫米,宽约2.3毫米,顶端突出部分等长于萼筒;萼筒无毛;花瓣较狭,近宿存,花后与萼齿常反折。 果期10月。

产湖北(利川、宣恩)。生于山坡灌丛中,海拔800—1000米。模式标本采自利川。

6. **莽山绣球**(广西植物) 图版44:1—6

Hydrangea mangshanensis Wei in 广西植物 **14** (2): 106. 1994. — *H. chinensis* auct. non Maxim.; Chun in Acta Phytotax. Sin. **3** (2): 119. 1954. p. p.

灌木,高1—2米;一年生小枝淡棕红色,与花序密被卷曲短柔毛,二年生或多年生小枝灰白色,光滑无毛,树皮不剥落。叶膜质,椭圆形或长圆形,长7—11厘米,宽2.5—4厘米,先端渐尖或短渐尖,具长的或短的尖头,基部阔楔形,边缘于基部以上具稀疏小齿或粗锯齿,上面深绿色,常被疏的粗长伏毛和短柔毛,中脉和侧脉上密被卷曲短柔毛,下面淡绿色,无毛;中脉于两面平坦或下面微凸,侧脉约6对,弯拱,下面微凸,小脉稀疏网状,两面不甚明显;叶柄长1—2厘米,上面沿凹槽密被卷曲短柔毛。伞房状聚伞花序顶生,直径4—7厘米,顶端截平或微拱,分枝3,细而柔软,中间的第一回分枝常较低;不育花常存在,萼片3—4,菱状椭圆形或三角状卵形,稍不等大,结果时长1.5—2厘米,宽1—1.7厘米,两端急尖或基部略钝或近截平,全缘;孕性花萼筒杯状,长约0.7毫米,宽约1.5毫米,萼齿三角形,长约0.5毫米;花瓣膜质,小,椭圆状菱形,长2—2.5毫米,宽约1毫米,基部具短爪;雄蕊10枚,近等长,长1.5—2.5毫米,花药长圆形,长不及1毫米;子房近半上位,花柱3—4,长约1毫米,结果时稍扩展,柱头增大,半环状。蒴果近球形,连花柱长3.5—4毫米,宽2.5—3毫米,顶端突出部分长1.2—1.5毫米,约等于萼筒的长度;种子淡棕色,近圆形或倒卵圆形,长和宽约0.5毫米,略扁,无翅,具网状脉纹。 花期5—6月,果期10—11月。

产湖南(东南部莽山)、广东(北部)。生于山谷溪边或山坡路旁密林或疏林中,海拔310—1500米。模式标本采自湖南宜章莽山。

7. **柳叶绣球**(植物分类学报) 狭叶绣球(中国植物图谱) 图版45:1—3

Hydrangea stenophylla Merr. & Chun in Sunyatsenia **1**: 50. 1930; Chun in Hu & Chun, Icon. Pl. Sin. **3**: pl. 139. 1933 et Acta Phytotax. Sin. **3** (2): 132. 1954. — *H. stenophylla* Merr. & Chun var. *decorticata* auct. non Chun; Chun op. cit. **3**(2): 133.



图版 44 1—6. 莽山绣球 *Hydrangea mangshanensis* Wei; 1. 花枝; 2. 花; 3. 花瓣; 4. 雄蕊; 5. 雌蕊; 6. 蒴果。7—11. 大瓣绣球 *H. macrosepala* Hayata; 7. 花枝; 8. 花; 9. 花瓣; 10. 雄蕊; 11. 雌蕊。(邓盈丰绘)