

1954. p. p.

灌木，高0.8—2米；一年生小枝淡紫色，干后略带褐色，二年生小枝通常白色，树皮平滑，无毛和皮孔，三年生小枝树皮常呈片状剥落。叶纸质，狭披针形或披针形，长8—20厘米，宽1—2.7厘米，有时宽达4.5厘米，先端渐尖或有时具钝尖头，基部狭楔形或略钝，边缘稍反卷，有疏离锯齿小齿，干后上面黄绿色，光滑无毛，下面干后淡紫绿色，新鲜时常呈紫红色，疏被紧贴微柔毛；中脉在上面平坦或有时近基部微凹，下面微凸，侧脉7—10对，纤细，弯拱，沿边缘向上延伸，且逐渐变细，最后直达齿端，两面稍明显，小脉不明显；叶柄长1—2厘米，无毛。伞房状聚伞花序具长4—12厘米的总花梗，直径5—12厘米，顶端截平或微拱，分枝3，中间1条的第一回分枝常较低，除总花梗和分枝下部无毛或近无毛外，密被紧贴短柔毛；不育花存在，稀少，萼片3—4，淡黄色，卵形、阔卵形或近圆形，不等大，长1—1.8厘米，宽0.9—1.5厘米，边全缘或具数小齿；孕性花绿白色，萼筒浅杯状，基部略尖，长约1毫米，宽约2毫米，疏被短柔毛，萼齿披针形、卵状披针形或三角形，长1.5—2.5毫米；花瓣狭椭圆形或椭圆形，长3—4毫米，宽1—1.5毫米，先端短渐尖，略具细尖头，基部稍狭，具长约0.5毫米的短爪；雄蕊8—10枚，几乎等长，长2.5—3毫米，花药阔长圆形，长1—1.5毫米；子房近半下位，花柱3—4，结果时长1.5—2毫米，直立或稍扩展，柱头小，头状。蒴果阔椭圆状，连花柱长5—6.5毫米，宽2.5—4毫米，顶端突出部分长2—2.5毫米，稍长于萼筒；种子淡褐色，卵圆形或椭圆形，长0.6—0.8毫米，无翅，具网状脉纹。花期5—6月，果期9—10月。

产江西（西南部）、广东（北部和西部）。生于山谷密林或疏林下或山坡灌丛中，海拔700—800米。模式标本采自广东乐昌。

8. 紫叶绣球 (植物分类学报) 三柱常山 (植物研究)

Hydrangea vinicolor Chun in Acta Phytotax. Sin. **3** (2): 129. fig. 1, 1954. —
Dichroa tristyla W. T. Wang et Nie in Bull. Bot. Res. **1** (1—2): 55. 1981.

灌木，高1—2.5米；小枝圆柱形，较粗，暗紫红色，无毛或初时被少许短柔毛，老后树皮呈薄片状剥落。叶纸质，披针形或狭椭圆形，长8—15厘米，宽2—4.5厘米，先端渐尖成一直的或微弯的长尖头，基部阔楔形或钝，嫩枝上的叶往往较狭长，长达18厘米，且基部沿叶柄两侧略下延呈圆耳状，边缘稍反卷，于基部以上具稀疏小齿，两面无毛，有光泽，干后常呈暗紫红色或下面色稍淡；中脉较粗，上面微凹或平坦，下面隆起，侧脉6—7对，纤细，弯拱，沿边缘向上延伸，彼此以小横脉相连，下面微凸，小脉网状，较密，下面明显凸起；叶柄粗短，长约1厘米，基部扩大，几乎抱茎，无毛或稍被短柔毛。伞房状聚伞花序顶生，直径4—6厘米，结果时达10厘米，密被卷曲短柔毛；不育花缺；孕性花较大，萼筒杯状，长1.2—1.5毫米，宽约2.5毫米，基部略尖，萼齿披针形，长1.5—2毫米，花后期长达3毫米；花瓣白色，狭椭圆形，长3.5—4.5（—5.5）毫

米，宽1—1.3（—1.5）毫米，具中脉和1对离基侧脉，先端具短细尖头，基部具长1—1.5毫米的长爪；雄蕊8—10枚，长3—4毫米，花药长圆形，长约1.5毫米；子房近半下位，花柱3，结果时长1.5—2毫米，扩展，柱头略增大，不下延或沿花柱内侧稍下延。蒴果香炉形，连花柱长5—6毫米，宽3.5—4毫米，顶端突出部分长约2毫米，与萼筒近等长；种子淡褐色，阔椭圆形或近圆形，长0.5—0.7毫米，宽0.4—0.5毫米，无翅，脉纹较粗，与种子同色，网状。花期4月，果期8—10月。

产江西（寻乌）、湖南、广东、广西和贵州（三都）。生于山谷密林或疏林下或山坡灌丛中，海拔300—900米。模式标本采自广东梅县。

9. 狭叶绣球（广西植物） 林氏八仙花（植物分类学报），林氏绣球（福建植物志）

Hydrangea lingii Hoo in Acta Phytotax. Sin. 1 (2): 195. 1951; 福建植物志 2: 227. 1985. — *H. chinensis* auct. non Maxim.: Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 119. 1954 (quoad specim. P. C. Tsoong 646; H. H. Chung 3294).

灌木，高0.7—1.7米；小枝圆柱形，暗紫褐色，初时疏被卷曲短柔毛，但很快变无毛，树皮薄，老后呈片状剥落。叶纸质，狭椭圆形，较小，长5—9厘米，宽1.5—2.5厘米，先端尾状渐尖，基部楔形，边缘于基部或近中部以上具稀疏小齿，干后两面常呈暗紫红色或暗褐色，有时下面色稍淡，两面光滑无毛，上面常具光泽；中脉稍粗壮，上面微凹或平坦，下面微凸，侧脉5—6对，上面不明显，下面微凸，小脉稀疏网状，两面明显；叶柄长5—10毫米，被疏柔毛或无毛。伞房状聚伞花序短小，直径5—7厘米，密被微卷曲的短柔毛；不育花缺；孕性花稀少，萼筒杯状，长约1毫米，基部钝圆，萼齿短小，卵状三角形，长0.5—0.7毫米；花瓣淡黄色，倒卵形或阔倒卵形，长2.5—3毫米，仅具1中脉，先端具短细尖头，基部的爪较长，长约1毫米；雄蕊8—10枚，近等长，长2.5—3毫米，花药长圆形，长约1.5毫米；子房半下位，花柱3，结果时长1.5—2毫米，上部略尖，直立或稍扩展，柱头小，头状。蒴果香炉形，连花柱长4.5—5.5毫米，宽3—3.5毫米，顶端突出部分长约1.5毫米，约等于萼筒长度；种子褐色，椭圆形或倒卵形，略扁，无翅，具网状脉纹。花期4—5月，果期9—11月。

产福建（崇安、顺昌、南平、三明、永安、德化）。生于山谷密林或疏林下或山坡灌丛中，海拔250—850米。

10. 珠光绣球（植物分类学报）

Hydrangea candida Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 128. pl. 9. 1954.

灌木，高约1.5米；小枝圆柱形，稍弯曲，树皮白色，老后呈薄片剥落。叶膜质，长卵形或椭圆形，长5—12厘米，宽2.5—5厘米，先端短尾状渐尖，微弯，基部阔楔形或钝圆，边缘除两端外，有稀疏小齿，干后上面淡黄色，下面灰白珍珠色且微带黄色，略有光泽，无毛或仅于下面脉上疏被紧贴短柔毛，侧脉7—9对，纤细，弯拱，沿边缘向上延伸，上面平坦或微凸，下面凸起，小脉网状，下面微凸；叶柄细，长0.5—1厘米，上