

米，宽1—1.3（—1.5）毫米，具中脉和1对离基侧脉，先端具短细尖头，基部具长1—1.5毫米的长爪；雄蕊8—10枚，长3—4毫米，花药长圆形，长约1.5毫米；子房近半下位，花柱3，结果时长1.5—2毫米，扩展，柱头略增大，不下延或沿花柱内侧稍下延。蒴果香炉形，连花柱长5—6毫米，宽3.5—4毫米，顶端突出部分长约2毫米，与萼筒近等长；种子淡褐色，阔椭圆形或近圆形，长0.5—0.7毫米，宽0.4—0.5毫米，无翅，脉纹较粗，与种子同色，网状。花期4月，果期8—10月。

产江西（寻乌）、湖南、广东、广西和贵州（三都）。生于山谷密林或疏林下或山坡灌丛中，海拔300—900米。模式标本采自广东梅县。

9. 狭叶绣球（广西植物） 林氏八仙花（植物分类学报），林氏绣球（福建植物志）

*Hydrangea lingii* Hoo in Acta Phytotax. Sin. 1 (2): 195. 1951; 福建植物志 2: 227. 1985. — *H. chinensis* auct. non Maxim.: Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 119. 1954 (quoad specim. P. C. Tsoong 646; H. H. Chung 3294).

灌木，高0.7—1.7米；小枝圆柱形，暗紫褐色，初时疏被卷曲短柔毛，但很快变无毛，树皮薄，老后呈片状剥落。叶纸质，狭椭圆形，较小，长5—9厘米，宽1.5—2.5厘米，先端尾状渐尖，基部楔形，边缘于基部或近中部以上具稀疏小齿，干后两面常呈暗紫红色或暗褐色，有时下面色稍淡，两面光滑无毛，上面常具光泽；中脉稍粗壮，上面微凹或平坦，下面微凸，侧脉5—6对，上面不明显，下面微凸，小脉稀疏网状，两面明显；叶柄长5—10毫米，被疏柔毛或无毛。伞房状聚伞花序短小，直径5—7厘米，密被微卷曲的短柔毛；不育花缺；孕性花稀少，萼筒杯状，长约1毫米，基部钝圆，萼齿短小，卵状三角形，长0.5—0.7毫米；花瓣淡黄色，倒卵形或阔倒卵形，长2.5—3毫米，仅具1中脉，先端具短细尖头，基部的爪较长，长约1毫米；雄蕊8—10枚，近等长，长2.5—3毫米，花药长圆形，长约1.5毫米；子房半下位，花柱3，结果时长1.5—2毫米，上部略尖，直立或稍扩展，柱头小，头状。蒴果香炉形，连花柱长4.5—5.5毫米，宽3—3.5毫米，顶端突出部分长约1.5毫米，约等于萼筒长度；种子褐色，椭圆形或倒卵形，略扁，无翅，具网状脉纹。花期4—5月，果期9—11月。

产福建（崇安、顺昌、南平、三明、永安、德化）。生于山谷密林或疏林下或山坡灌丛中，海拔250—850米。

10. 珠光绣球（植物分类学报）

*Hydrangea candida* Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 128. pl. 9. 1954.

灌木，高约1.5米；小枝圆柱形，稍弯曲，树皮白色，老后呈薄片剥落。叶膜质，长卵形或椭圆形，长5—12厘米，宽2.5—5厘米，先端短尾状渐尖，微弯，基部阔楔形或钝圆，边缘除两端外，有稀疏小齿，干后上面淡黄色，下面灰白珍珠色且微带黄色，略有光泽，无毛或仅于下面脉上疏被紧贴短柔毛，侧脉7—9对，纤细，弯拱，沿边缘向上延伸，上面平坦或微凸，下面凸起，小脉网状，下面微凸；叶柄细，长0.5—1厘米，上