

Phytotax. Sin. **3** (2): 122. pl. 7, 1954. — *H. kwangtungensis* Merr. var. *elliptica* Chun op. cit. **3** (2): 123. 1954.

灌木，高1—2米；小枝圆柱形，红褐色，与叶柄、叶片、花序等密被扩展、半透明、黄绿色近宿存的长柔毛。叶薄纸质或近膜质，长圆形或椭圆形，长5—13.5厘米，宽1.5—3厘米，先端渐尖，具尾状尖头，基部渐狭，略钝，边缘除两端外，有疏离、具短芒尖的锯齿或小齿，或有时几近全缘，上面暗黄绿色，密被粗长伏毛，下面灰绿色，密被软弱长柔毛，中脉上的毛较粗长，具光泽；中脉在上面微凹，下面凸起，侧脉6—7对，纤细，微弯，下面微凸，小脉稀疏网状，下面稍明显；叶柄长4—8毫米。伞形状聚伞花序顶生，顶部稍弯拱；不育花缺；孕性花小而密集，萼筒浅杯状，长约1毫米，被疏柔毛，萼齿长卵形，长约1.4毫米，先端略尖，被毛；花瓣白色，椭圆形，长2.5—3毫米，先端短渐尖或急尖，具极短的细尖头，基部具短爪，爪长约0.5毫米；雄蕊10枚，近等长，长1.5—2.5毫米，花药阔长圆形，长不及1毫米；子房半下位，花柱3，结果时长1.5—2毫米，直，稍扩展，柱头增大，椭圆状，沿花柱内侧稍下延。蒴果近球形，不连花柱长和宽3—3.5毫米，顶端突出部分非圆锥形，其长等于萼筒；种子黄色，椭圆形，无翅，具网状脉纹。花期5月，果期11月。

产广东（英德、翁源、大埔）、广西（上思）、江西（全南）。生于山谷密林或山顶疏林中，海拔960—1020米。模式标本采自广东英德。

15. 粤西绣球（植物分类学报）

Hydrangea kwangsiensis Hu in Journ. Arn. Arb. **12**: 152. 1931. et Hu & Chun Icon. Pl. Sin. **3**: pl. 135, 1933; Chun in Acta Phytotax. Sin. **3** (2): 134. 1954.

15a. 粤西绣球（原变种） 图版45: 4—5

var. *kwangsiensis*

灌木，高1—3米，小枝圆柱形，淡褐色，无毛，具明显的环状叶痕。叶纸质，披针形或阔披针形，长9—20厘米，宽1.5—5.5厘米，先端渐尖或具短尾状尖头，基部狭楔形、阔楔形或钝圆，两侧稍不对称，上面无毛，下面被疏散、紧贴微柔毛，边缘稍反卷，近全缘或基部以上有具硬尖头的稀疏小齿；中脉粗壮，上面平坦，下面微凸，侧脉6—8对，有时11对，纤细，弯拱，下面微凸或清晰可见，网脉两面不明显；叶柄长1—3厘米，基部扩大几乎全部抱茎。伞房状聚伞花序具长6—12厘米的总花梗，顶端截平，分枝3，扩展，中间的分枝远比两侧的短，密被紧贴短柔毛；不育花萼片4，少有3或5，白色，广椭圆形或卵形，不等大，长1—3厘米，宽1—2厘米，全缘，先端圆或微凹；孕性花萼筒长陀螺状，被短柔毛，萼齿卵形或卵状披针形，长0.7—2毫米，宽1—1.2毫米；花瓣长椭圆形，长3—3.5毫米，宽1.5—2毫米，先端稍钝，花后外反，蓝色；雄蕊10枚，近等长，与花瓣等长或稍长之，花药长圆形，长1—1.5毫米；子房4/5下位，花柱3，钻状，结果时长2—2.5毫米，扩展或稍外反，柱头小，头状。蒴果长陀螺状，不