

微凹，基部具短爪，全缘，两面被微柔毛；孕性花蓝紫色，花萼筒状，花蕾时长约 1.5 毫米，被毛，萼齿三角形，长约 1 毫米；花瓣椭圆形，花蕾时长约 2 毫米；雄蕊 10 枚，近等长；子房超过一半下位，花柱 3—4，结果时长 1—1.5 毫米，扩展，柱头稍扩大，头状或近半环状。蒴果近球形，不连花柱长 3—3.5 毫米，宽 2.5—3 毫米，顶端突出部分 0.7—1 毫米，比萼筒短；种子棕色，阔倒卵形或阔椭圆形，长 0.3—0.4 毫米，无翅或有时两端具极短的翅，具网状脉纹。花期 6—7 月，果期 9—10 月。

产福建（崇安、南平）。生于山坡密林下或路旁灌丛中，海拔 230—800 米。模式标本采自南平。

17. 尾叶绣球（植物研究）

Hydrangea caudatifolia W. T. Wang et Nie in Bull. Bot. Res. 1 (1—2): 54. 1981.

灌木，高约 1 米；小枝圆柱形，淡黄色，初时与叶柄、花序梗、花柄密被淡黄色短柔毛，老后渐变无毛。叶膜质，椭圆形或倒长卵形，长 7—19.5 厘米，宽 2.5—8.5 厘米，先端尾状渐尖，基部阔楔形，边缘除基部外具粗长锯齿，干后上面暗黄褐色，疏被短柔毛，中脉上的毛稍长，下面色较淡，密被短柔毛，脉上的毛较密；中脉较宽，两面平坦或下面微凸，侧脉 7—9 对，纤细，上部稍弯拱，下面微凸，小脉多数横出，网状，下面明显；叶柄较粗，长 2—3 厘米，基部稍扩大或不扩大。伞房状聚伞花序顶生，具短的总花梗，结果时直径达 13 厘米，顶端微拱，分枝 3，近等长；不育花具长柄，萼片 4，偶有 3 或 5，近圆形或扁圆形，长 1.2—1.7 厘米，宽 1.1—2 厘米，基部具短爪，边全缘或顶部具数小钝齿，下面沿脉被短柔毛；孕性花小，萼筒长约 1 毫米，萼齿三角形，长 0.5—0.8 毫米；花瓣紫色，长卵形，长 3—3.5 毫米；雄蕊 10 枚，近等长，长的略长于花瓣，长约 5 毫米，短的与花瓣近等长；子房大半下位，花柱 2—3，结果时长约 1 毫米，直，柱头头状。蒴果近球形，小，不连花柱长 2—2.5 毫米，宽 1.5—2 毫米，被疏短柔毛，顶端突出部分长 0.5—0.7 毫米，约等于蒴果长度的 1/3；种子淡棕色，长圆形或近圆形，长 0.4—0.5 毫米，宽 0.3—0.4 毫米，具纤细的网状脉纹，无翅或有时一端或两端具微翅。

花期 6 月，果期 10 月。

产江西（黎川）。生于竹林下，海拔 600—700 米。模式标本采自江西黎川武夷山。

18. 浙皖绣球（考察与研究） 图版 48: 1—5

Hydrangea zhewanensis Hsu et X. P. Zhang in Investig. Stud. Nat. 7: 12. 1987. — *H. macrophylla* (Thunb.) Ser. var. *normalis* auct. non Wils.; Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 127. 1954 (quoad specim. S. Chen 484).

灌木，高 0.7—1.5 米；小枝淡褐色，圆柱形或略具钝棱，幼时密被卷曲短柔毛，老后渐变无毛，树皮常呈薄片状剥落。叶近膜质或薄纸质，椭圆形或菱状椭圆形，长 6—19 厘米，宽 3—8 厘米，先端渐尖，具尾状长尖头或短尖头，基部沿叶柄两侧稍下延呈阔楔形或楔形，边缘有锐锯齿，上部的齿常较大，干后两面淡褐色或上面颜色较深，无毛或