

白色；孕性花萼筒钟状，长约 1.5 毫米，萼齿阔三角形，先端尖，长不及 1 毫米；花瓣长卵形，长 2—2.5 毫米，先端急尖，基部截平；雄蕊不等长，长的长约 4.5 毫米，短的稍短于花瓣，花药近圆形，长约 0.5 毫米；子房下位，花柱多数 3，少有 2，结果时长约 2 毫米，外弯，柱头略增大。蒴果坛状，不连花柱长和宽 3—3.5 毫米，顶端截平，基部略尖，具棱；种子褐色，阔椭圆形或近圆形，长 0.4—0.5 毫米，稍扁，具凸起的纵脉纹，两端各具 0.15—0.2 毫米的翅，先端的翅宽扁，钝三角形或卵状披针形，基部的收狭呈一柄状物。花期 8—9 月，果期 10—11 月。

产云南、四川、贵州和广西隆林。生于山谷密林或山坡灌丛中，海拔 1400—4000 米。尼泊尔、锡金、越南也有分布。

32. **蜡莲绣球** (植物分类学报) 倒卵蜡莲绣球、狭叶蜡莲绣球、长叶蜡莲绣球、八仙蜡莲绣球、紫背绣球 (植物分类学报)

Hydrangea strigosa Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 31. 1911; Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 153. 1954; 中国高等植物图鉴 2: 108. 图 1945, 1972. — *H. aspera* D. Don. var. *angustifolia* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 375. 1900. — *H. strigosa* Rehd. var. *angustifolia* (Diels) Rehd. op. cit. 1: 32. 1911. — *H. strigosa* Rehd. var. *sinica* (Diels) Rehd. op. cit. 1: 32. 1911. — *H. aspera* D. Don var. *sinica* Diels l. c. — *H. strigosa* Rehd. f. *sterilis* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 11: 160. 1930; Chun op. cit. 3 (2): 156. 1954. — *H. strigosa* Rehd. var. *longifolia* Chun op. cit. 3 (2): 154. 1954. — *H. strigosa* Rehd. var. *purpurea* C. C. Yang in Acta Phytotax. Sin. 20 (4): 474. 1982.

32a. **蜡莲绣球** (原变种)

var. **strigosa**

灌木，高 1—3 米；小枝圆柱形或微具四钝棱，灰褐色，密被糙伏毛，无皮孔，老后色较淡，树皮常呈薄片状剥落。叶纸质，长圆形、卵状披针形或倒卵状倒披针形，长 8—28 厘米，宽 2—10 厘米，先端渐尖，基部楔形、钝或圆形，边缘有具硬尖头的小齿或小锯齿，干后上面黑褐色，被稀疏糙伏毛或近无毛，下面灰棕色，新鲜时有时呈淡紫红色或淡红色，密被灰棕色颗粒状腺体和灰白色糙伏毛，脉上的毛更密；中脉粗壮，上面平坦，下面隆起，侧脉 7—10 对，弯拱，沿边缘长延伸，上面平坦，下面凸起，小脉网状，下面微凸；叶柄长 1—7 厘米，被糙伏毛。伞房状聚伞花序大，直径达 28 厘米，顶端稍拱，分枝扩展，密被灰白色糙伏毛；不育花萼片 4—5，阔卵形、阔椭圆形或近圆形，结果时长 1.3—2.7 厘米，宽 1.1—2.5 厘米，先端钝头渐尖或近截平，基部具爪，边全缘或具数齿，白色或淡紫红色；孕性花淡紫红色，萼筒钟状，长约 2 毫米，萼齿三角形，长约 0.5 毫米；花瓣长卵形，长 2—2.5 毫米，初时顶端稍连合，后分离，早落；雄蕊不等长，较长的长约 6 毫米，较短的长约 3 毫米，花药长圆形，长约 0.5 毫米；子房下位，花