

花瓣近等长，较长的长 4—5 毫米；子房下位，花柱 2，结果时长约 1 毫米，扩展或稍外弯，柱头近半环状。蒴果坛状，不连花柱长和宽约 3 毫米，顶端截平，基部圆，具棱；种子褐色，椭圆形或纺锤形，长 0.4—0.5 毫米，稍扁，具凸起的纵脉纹，两端各具 0.15—0.25 毫米长的翅，先端的翅较长，扁平，基部的较狭。花期 7—8 月，果期 9—10 月。

产甘肃（文县），陕西（略阳），江苏，湖北（西南部），湖南（西南部），广西（北部至东北部），贵州大部，四川（中部、东部和东南部），云南（东南部、东北部、北部和西北部）。生于山谷溪边密林或疏林下，或山坡路旁灌丛中，海拔 700—2600 米。模式标本采自四川汶川。

34. 光柄绣球（植物分类学报）

Hydrangea glabripes Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 30. 1911; Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 151. 1954.

灌木，高约 1 米；小枝圆柱形，较细，无毛或近无毛，老时淡黄珍珠灰色，树皮不剥落。叶披针形，长 6—12 厘米，宽 2—3 厘米，先端渐尖，基部阔楔形或圆形，边缘有具硬尖头的锯齿形小齿，上面暗黄绿色，密被小糙伏毛，下面苍白色，密被长柔毛，但中脉上几无毛；叶柄细小，长 1.5—4 厘米，无毛，仅上面凹槽边被稀疏短柔毛。伞房状聚伞花序直径 8—10 厘米，顶端平或稍弯拱，分枝短，密集，紧靠，彼此间间隔小，被糙伏毛；不育花萼片 4，红色，阔倒卵形，先端微凹，全缘；孕性花玫瑰红色，萼筒半球状，基部被疏柔毛，萼齿三角形，短小；花瓣长卵形，长约 1.5 毫米；雄蕊不等长，较长的长约 4 毫米；子房下位，花柱 2。蒴果未见。花期 8 月。

产湖北（房县）。生于密林中，海拔 1200—1800 米。

本种未见到标本，以上描述仅根据文献摘译。

35. 蕤兰绣球（植物分类学报） 蕤兰（四川宝兴），长柄绣球（中国植物图谱）

Hydrangea longipes Franch. in Nouv. Arch. Mus. Nat. Hist. Paris sér. 2, 8: 227. 1885; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 33. 1911 et in Journ. Arn. Arb. 9: 51. 1928; Hu in Hu & Chun, Icon. Pl. Sin. 3: 40. pl. 140, 1933; 陈嵘，中国树木分类学 282. 1937; Chun in Acta Phytotax. Sin. 3 (2): 157. 1954. p. p.; 中国高等植物图鉴 2: 108. 图 1946, 1972. — *H. longipes* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 273. 1887. — *H. aspera* D. Don var. *longipes* (Franch.) Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 374. 1900. — *H. hemsleyana* Diels op. cit. 23: 376. 1900. — *H. hemsleyana* Diels var. *pavonliniana* Pampan. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17: 284. 1910.

35a. 蕤兰绣球（原变种） 图版 53: 1—5

var. *longipes*

灌木，高 1—3 米；小枝圆柱形，淡黄色，被黄色短柔毛，老后树皮不剥落。叶膜质或薄纸质，干后常呈淡绿色，阔卵形、阔倒卵形、长卵形或长倒卵形，长 8—20 厘米，宽