

1924; 中国树木志 2: 1586. 1985.

本变种通常枝刺较粗壮, 有时长达 3 厘米, 稀较短小; 花萼外面无毛或几无毛; 子房和果实无柔毛, 也无腺毛。

产山西 (太原)、甘肃 (兰州、榆中、岷县)、宁夏 (海原)、青海 (玉树、门源、互助)、四川 (康定、马尔康、刷经寺、小金、德格)。生于山坡阴处阔叶林或针叶林下及林缘, 海拔 2500—3700 米。模式标本采自四川康定。

此变种刺长大而粗壮, 可栽培作绿篱及观赏用。

5. **刺果茶藨子** (华北经济植物志要) 刺李 (东北木本植物图志), 刺梨、山梨 (中国高等植物图鉴), 刺醋李 (小兴安岭木本植物), 醋栗 (中国果树分类学), 酸溜溜 (山西土名)

Ribes burejense Fr. Schmidt in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. ser. 7. 12 (2): 42. 1868 “burejensis”; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 19: 249 (Mél. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. 9: 216. 1873) 1874; Kom. Fl. Mansh. 2: 435. 1903; Jancz. in Engl. Bot. Jahrb. 36: (Beibl. 82): 51. 1905 et in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève 35. 3: 371 fig. 99. 1907; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 5: 165. 1924 et Man. Cult. Trees & Shrubs 314. 1927; Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 43. tab. 9. 1926; 中国高等植物图鉴 2: 118. 图 1965. 1972; 中国树木志 2: 1587. 图 786. 1985; 黑龙江树木志 251. 图版 66. 图 1—3. 1986. — *R. macrocalyx* Hance in Journ. Bot. 13: 35. 132. 1875; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 6: 6. 1883. — *R. grossularioides* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 279. 1887, non Maxim. 1874. — *Grossularia burejensis* (Fr. Schmidt) Berger, Taxon. Rev. Curr. Gooseb. 112. 1924; Pojark. in Kom. Fl. USSR 9: 270. 1939; 东北木本植物图志 263. 图版 94. 图 170. 1955.

5a. **刺果茶藨子** (原变种)

var. **burejense**

落叶灌木, 高 1—1.5 (2) 米; 老枝较平滑, 灰黑色或灰褐色, 小枝灰棕色, 幼时具柔毛, 在叶下部的节上着生 3—7 枚长达 1 厘米的粗刺, 节间密生长短不等的细针刺; 芽长圆形, 先端急尖, 具数枚干膜质鳞片。叶宽卵圆形, 长 1.5—4 厘米, 宽 1.5—5 厘米, 不育枝上的叶较大, 基部截形至心脏形, 幼时两面被短柔毛, 老时渐脱落, 下面沿叶脉有时具少数腺毛, 掌状 3—5 深裂, 裂片先端稍钝或急尖, 边缘有粗钝锯齿; 叶柄长 1.5—3 厘米, 具柔毛, 老时脱落近无毛, 常有稀疏腺毛。花两性, 单生于叶腋或 2—3 朵组成短总状花序; 花序轴长约 4—7 毫米, 具疏柔毛或几无毛, 或具疏腺毛; 花梗长 5—10 毫米, 疏生柔毛或近无毛, 有时疏生腺毛; 苞片宽卵圆形, 长 3—4 毫米, 宽约 3 毫米, 先端急尖或稍钝, 被柔毛, 具 3 脉; 花萼浅褐色至红褐色, 疏生柔毛或近无毛; 萼筒宽钟