

系 2. 小叶系 Ser. Humilia L. T. Lu in Acta Phytotax. Sin. **33** (1): 67. 1995.

叶较小, 长 1—2 厘米, 顶生裂片比侧生裂片稍长, 先端急尖; 花序轴和花梗具柔毛和腺毛, 稀不具柔毛; 花萼外面无毛或具短柔毛; 萼片开展或反折。

本系的模式种: 矮醋栗 *R. humile* Jancz.

本系有下列 3 种。

38. 矮醋栗 (拉汉种子植物名称) 黄果矮茶藨 (中国树木志)

Ribes humile Jancz. in Bull. Intern. Acad. Sci. Cracovie Cl. Sci. Math. Nat. **1910**: 73. fig. 3. 1910; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. **1**: 153. 1912; Chung in Mém. Sci. Soc. China **1** (1): 70. 1924.

低矮丛生小灌木, 高约 1 米, 稀稍高; 小枝灰褐色或紫褐色, 有时黑灰色, 皮稍条状剥裂, 嫩枝细瘦, 棕褐色至棕红色, 无毛, 无刺; 芽小, 卵圆形, 长约 3—4 毫米, 先端急尖, 具数枚褐色鳞片, 外面无毛。叶近圆形或卵圆形, 长 1—2 厘米, 宽几与长相似, 基部截形至浅心脏形, 两面无毛, 稀于上面疏生腺毛, 常掌状 3 裂, 裂片三角状卵圆形, 顶生裂片稍长于侧生裂片, 先端急尖, 侧生裂片较小, 先端圆钝, 边缘具粗钝锯齿; 叶柄长 5—10 毫米, 无毛。花单性, 雌雄异株, 排成短总状花序; 雄花序长 1.5—3.5 厘米, 具花 7 至 10 余朵; 雌花序较短而具花稍少; 花序轴和花梗无柔毛, 疏生短腺毛; 花梗长 2—4 毫米; 苞片长圆形或椭圆形, 长 3—5 毫米, 宽 1—2 毫米, 先端急尖至短渐尖, 无柔毛或边缘微具疏腺毛; 花萼紫红色, 外面无毛; 萼筒杯形, 长 2—3 毫米, 宽稍大于长; 萼片卵圆形, 长 1.5—2.5 毫米, 宽几与长相似, 先端圆钝, 直立或开展, 稀反折; 花瓣极小, 近扇形或近倒卵圆形, 先端圆钝或平截; 雄蕊稍长于花瓣, 花药近圆形; 雌花的雄蕊退化; 子房光滑无毛, 雄花的子房败育; 花柱先端 2 浅裂。果实圆形, 直径 5—7 毫米, 红色, 无毛。花期 5—6 月, 果期 7—8 月。

产四川 (巫溪、灌县、松潘、黑水、茂汶、汶川、理县、刷经寺、松岗、马尔康、甘孜、康定、九龙、木里)。生于路边林下或山坡灌丛中, 海拔 1000—3300 米。模式标本采自灌县。

39. 光萼茶藨子 (植物分类学报)

Ribes glabricalycinum L. T. Lu in Acta Phytotax. Sin. **31** (5): 457. fig. 1. 5—7. 1993.

落叶小灌木, 高约 1 米或稍高; 小枝灰黑色或灰褐色, 平滑, 皮呈条状剥离, 嫩枝棕褐色或红褐色, 具短柔毛, 老时无毛, 无刺; 芽长卵圆形, 长 3—6 毫米, 先端急尖, 具数枚草质鳞片, 外面微被短柔毛或几无毛。叶宽卵圆形, 长宽各约 1—2 厘米, 基部近截形至心脏形, 上面深绿色, 下面色较浅, 两面均被细短柔毛, 并常混生腺体或上面疏生短腺毛, 掌状 3—5 裂, 裂片先端急尖, 稀稍钝, 顶生裂片宽卵圆形或菱形, 比侧生裂