

长于花瓣，花丝绿色，花药近圆形，黄白色；雌花的雄蕊短小，花药无花粉；子房具腺毛，雄花的子房败育；花柱先端2浅裂。果实近球形或椭圆形，直径5—8毫米，红色或红褐色，具短腺毛。花期4—5月，果期7—9月。

产四川(西部)、云南(西北部)。生于山麓灌丛、针叶林缘、沟边或路旁，海拔2500—4000米。模式标本采自四川康定。

此种和束果茶藨子 *R. takare* D. Don var. *desmocarum* (Hook. f. & Thoms.) L. T. Lu 常易相混，区别在于本种叶小，长2—5厘米，边缘浅裂或几不分裂，顶生裂片与侧生裂片近等长，稀稍长，裂片先端常圆钝，稀微尖；花序较短，长3.5—7厘米，具较密集排列的花朵；花萼绿色或绿色带红褐色，萼片反折或开展，具不显著5脉。

与本种相近者还有下列1种，即 *R. rosthornii* Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**: 378. 1901. 该种原始记载摘录如下：枝短缩而开展。叶长、宽各3—4厘米，基部心脏形或近心脏形，近无柔毛，具腺毛，3浅裂至近不分裂，裂片近急尖，边缘具稍钝锯齿；叶柄长1—1.5厘米，具腺毛。总状花序顶生，雄花序未见。果序小，长约2.5厘米，具果5个；花序轴具腺毛；花梗极短；苞片卵状长圆形，长4—5毫米，边缘具腺毛；萼片卵圆形；花瓣小，匙形；花柱2裂。果实近球形，红色，具腺毛，具种子7—10枚。产四川南川县。

此种和康边茶藨子 *R. kialanum* Jancz. 外貌相近，疑为同物异名，因未见模式标本，原始记载又较简单，暂时未能解决。

52. 小果茶藨子 (秦岭植物志) 魏氏茶藨子 (经济植物手册)

Ribes vilmorinii Jancz. in Bull. Intern. Acad. Sci. Cracovie Sci. Cl. Math. Nat. **1906**: 290. 1906 et in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève **35**, **3**: 462. fig. 167. 168. 1907; 秦岭植物志 **1** (2): 447. 1974; 中国树木志 **2**: 1574. 1985.

52a. 小果茶藨子 (原变种) 图版 72: 7—9

var. *vilmorinii*

落叶小灌木，高1—3米；小枝灰色、灰褐色至灰黑色，皮纵向剥落，嫩枝红褐色，具短柔毛，稀近无毛，无刺；芽卵圆形，长3—5毫米，先端稍钝至微尖，鳞片褐色至红褐色，外面无毛或微具短柔毛。叶卵圆形或近圆形，长、宽各2—4厘米，基部截形，稀浅心脏形，上面疏生腺毛，下面无毛或沿叶脉及边缘有少数腺毛，掌状3—5浅裂，顶生裂片三角状长卵圆形，长于侧生裂片1倍以上，先端急尖至短渐尖，侧生裂片卵圆形，先端急尖或稍钝，边缘具不整齐的粗钝重锯齿；叶柄长1—2厘米，疏生腺毛。花单性，雌雄异株，组成直立总状花序；雄花序生于侧生小枝顶端，长1.5—2.5厘米，具花数朵至10余朵；雌花序较短，长约1—1.5厘米，具花2—7朵；花序轴和花梗具短柔毛和腺毛；花梗长1—2毫米；苞片椭圆形或椭圆状披针形，长2—5毫米，宽1—1.5毫米，先端稍钝或微尖，边缘疏生短腺毛，早落；花萼近辐状，绿色或微带红褐色，外面具短柔毛，稀