

中国树木志 2: 1576. 1985. — *R. cuneatum* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Moscou **14**: 426. 1841 et **15**: 356. 1842. — *R. diacantha* auct. non Pall. 1776; Regel et Herd. in Bull. Soc. Nat. Moscou **39** (2): 68. 1866.

落叶低矮灌木，高 0.5—1 米；枝灰棕色，皮呈纵向长条状剥裂，幼枝棕色或棕褐色，微具短柔毛或无毛，在叶下部的节上常具 1 对小刺，节间具稀疏针状细刺或无刺；芽长卵圆形，长 3—5 毫米，先端急尖，幼时微具柔毛，老时无毛。叶倒卵圆形，长 1—2.5 厘米，宽几与长相似，基部楔形，上面灰绿色，下面色较浅，老时仅沿叶缘具细短柔毛或有时下面也微具短柔毛，上半部掌状浅 3 裂，裂片先端钝或微尖，顶生裂片稍长于侧生裂片，边缘具粗钝锯齿；叶柄长 1—2 厘米，无毛。花单性，雌雄异株，组成总状花序；雄花序长 3—6 厘米，直立；雌花序长 3—5 厘米，具花 10 余朵，结果时长达 6 厘米；花序轴和花梗具短柔毛，老时毛渐脱落；花梗长 2—3 毫米；苞片长圆形或舌形，长 4—6 毫米，宽 1—1.5 毫米，先端钝或微尖，边缘有细短柔毛，具单脉；花萼浅绿色，外面无毛；萼筒盆形或浅杯形，长 1.5—2 毫米，宽大于长；萼片舌形或倒卵圆形，长 2—3 毫米，先端圆钝，向外反折；花瓣小，扇形，先端平截；雄蕊几与花瓣近等长；雌花中雄蕊花丝极短，花药无花粉；子房光滑无毛，雄花中子房退化；花柱先端 2 裂。果实球形，直径 5—7 毫米，熟时暗红色，无毛。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

产新疆（阿尔泰、特克斯、塔城等地）。生于低海拔地区的干旱山坡灌丛中及岩石坡地。中亚和西伯利亚也有分布。模式标本采自原苏联达乌里亚。

57. 美丽茶藨子（经济植物手册） 小叶茶藨（东北木本植物图志），碟花茶藨子（华北经济植物志要），高雅-乌混-少布特日（蒙名）

Ribes pulchellum Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou **5**: 191. 1832; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. **19**: 266 (Mél. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **9**: 241. 1873) 1874; Jancz. in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève **35**. **3**: 453. fig. 162. 1907; Pojark. in Kom. Fl. USSR **9**: 266. 1939; 东北木本植物图志 254. 图版 91. 图 158. 1955; 中国高等植物图鉴 **2**: 117. 图 1963. 1972; 内蒙古植物志 **3**: 14. 图版 7. 图 1—4. 1977; 中国树木志 **2**: 1575. 1985.

57a. 美丽茶藨子（原变种）

var. *pulchellum*

落叶灌木，高 1—2.5 米；小枝灰褐色，皮稍纵向条裂，嫩枝褐色或红褐色，有光泽，被短柔毛，老时毛脱落，在叶下部的节上常具 1 对小刺，节间无刺或小枝上散生少数细刺；芽卵圆形，长 3—4 毫米，先端圆钝或微尖，具数枚褐色鳞片，外面幼时具短柔毛。叶宽卵圆形，长、宽各为 (1) 1.5—3 厘米，基部近截形至浅心脏形，上面暗绿色，下面色较浅，两面具短柔毛，老时毛较稀疏，掌状 3 裂，有时 5 裂，边缘具粗锐或微钝单锯齿，或混生重锯齿；叶柄长 (0.5) 1—2 厘米，具短柔毛或混生稀疏短腺毛。花单性，雌